**Современные аспекты
хирургического лечения
коарктации аорты у пациентов
разных возрастных групп**

**ГБУЗ НО «Специализированная
кардиохирургическая клиническая
больница»**

К.м.н., Чистяков И.С.

Определения

Коарктация аорты – сужение нисходящей грудной аорты, не затрагивающее левой подключичной артерии.

Коарктацию аорты не следует путать с **физиологическим сужением перешейка аорты**. Диаметр перешейка может составлять $\geq 40\%$ от диаметра восходящей аорты.

Коарктация аорты

Теория дуктальной ткани

- Ткань аорты в области коарктации гистологически похожа на миксоматозную ткань открытого артериального протока с циркулярной инфильтрацией гладкомышечных клеток (ГМК) в стенку аорты.
- Сокращение этих ГМК и приводит к формированию сужения аорты в месте напротив протока. В некотором смысле это процесс, обратный формированию ОАП.
- Обструктивные аномалии правых отделов сердца (например, тетрада Фалло) с право-левым внутрисердечным шунтированием и дуктальным потоком из аорты в легочную артерию **НИКОГДА** не сочетается с коарктацией аорты. Это служит косвенным подтверждением теории миграции ГМК в аорту.

Основные аспекты патогенеза

Повышенная постнагрузка на сердце – развитие проявлений **левожелудочковой сердечной недостаточности**.

Повышенное давление в сосудах дуги аорты – развитие **злокачественной артериальной гипертензии с исходом в ОНМК**.

- Гипоперфузия сосудистого русла ниже уровня перешейка аорты – **почечная недостаточность**, признаки хронической артериальной недостаточности нижних конечностей (отсутствие пульсации на бедренных артериях, перемежающаяся хромота, повышенная утомляемость).

Типичные признаки коарктации аорты

- Отсутствие или ослабление пульсации на артериях нижних конечностей.
- Артериальная гипертензия (повышенное АД на верхних конечностях при сниженном АД в нижних конечностях).
- Признаки сердечной недостаточности (одышка, повышенная утомляемость при физической нагрузке).
- Слабость в ногах, перемежающаяся хромота.
- УЗДГ артерий нижних конечностей: коллатеральный или магистрально-измененный кровоток на бедренных артериях.
- При выполнении ЭхоКГ: наличие стенотического кровотока с ГСД выше 20 мм рт.ст. на уровне перешейка аорты; снижение ФВ левого желудочка (при осложненном течении порока).
- На R-графии грудной клетки: увеличенная тень сердца, признаки легочной гиперволемии, узурация ребер.
- На МСКТ грудной клетки с в/в контрастированием: наличие анатомического сужения нисходящей аорты до <40% от диаметра восходящей аорты.

Гипоплазия дуги аорты

Гипоплазия дуги аорты – сужение дуги аорты на протяжении, при котором диаметр проксимального её отдела составляет менее 60%, а диаметр дистального отдела дуги аорты – менее 50% от диаметра восходящей грудной аорты.

Критическая неонатальная коарктация аорты

1. Частое сочетание с гипоплазией дуги аорты.
2. Бессимптомное течение до начала закрытия ОАП (0-5-е сутки жизни).
3. Снижение и полное прекращение перфузии ниже уровня перешейка аорты на 2-5 сутки жизни (десатурация, гипоксическое повреждение органов брюшной полости и забрюшинного пространства с быстрым развитием СПОН).
4. При продолжении функционирования ОАП развитие острой левожелудочковой недостаточности с развитием отека легких, чаще на 5 – 14-е сутки жизни.

Лечение критической неонатальной коарктации

- **Непрерывная инфузия простогландина E_1** в дозе **0,01 – 0,02 мкг/кг/мин** с момента постановки диагноза до момента пережатия аорты / начала искусственного кровообращения во время операции.
- **Ограничение ингаляции O_2** (21% во вдыхаемой смеси при необходимости ИВЛ).
- Оптимальные сроки хирургической коррекции порока 5-10-е сутки жизни.
- Методы коррекции: резекция коарктации аорты с наложением анастомоза «конец в конец» или пластика дуги аорты в условиях гипотермического искусственного кровообращения и унилатеральной церебральной перфузии.

Баллонная дилатация коарктации аорты

Резекция коарктации аорты с наложением анастомоза «конец в конец»

Пластика дуги аорты

Младенческая форма коарктации аорты

- Когда закрытие ОАП происходило медленно, быстро сформировались коллатерали.
- Преобладают проявления хронической сердечной недостаточности.

Типичные признаки коарктации аорты

- Отсутствие или ослабление пульсации на артериях нижних конечностей.
- Артериальная гипертензия (повышенное АД на верхних конечностях при сниженном АД в нижних конечностях).
- Признаки сердечной недостаточности (тахипноэ, повышенная утомляемость при кормлении).
- Слабость в ногах, перемежающаяся хромота.
- УЗДГ артерий нижних конечностей: коллатеральный или магистрально-измененный кровоток на бедренных артериях.
- При выполнении ЭхоКГ: наличие стенотического кровотока с ГСД выше 20 мм рт.ст. на уровне перешейка аорты; снижение ФВ левого желудочка.
- На R-графии грудной клетки: увеличенная тень сердца, признаки легочной гиперволемии, узурация ребер.
- На МСКТ грудной клетки с в/в контрастированием: наличие анатомического сужения нисходящей аорты до <40% от диаметра восходящей аорты.

Резекция коарктации аорты с наложением анастомоза «конец в конец»

Коарктация у детей старшего возраста и взрослых

- Коарктация носит умеренный характер.
- Успеваает сформироваться хороший коллатеральный кровоток.

Типичные признаки коарктации аорты

- Отсутствие или ослабление пульсации на артериях нижних конечностей.
- Артериальная гипертензия (повышенное АД на верхних конечностях при сниженном АД в нижних конечностях).
- Признаки сердечной недостаточности (одышка, повышенная утомляемость при физической нагрузке).
- Слабость в ногах, перемежающаяся хромота.
- УЗДГ артерий нижних конечностей: коллатеральный или магистрально-измененный кровоток на бедренных артериях.
- При выполнении ЭхоКГ: наличие стенотического кровотока с ГСД выше 20 мм рт.ст. на уровне перешейка аорты; снижение ФВ левого желудочка (при осложненном течении порока).
- На R-графии грудной клетки: увеличенная тень сердца, признаки легочной гиперволемии, узурация ребер.
- На МСКТ грудной клетки с в/в контрастированием: наличие анатомического сужения нисходящей аорты до <40% от диаметра восходящей аорты.

Варианты хирургической коррекции у детей старшего возраста и взрослых

Коллатеральное кровообращение при коарктации аорты

Стентирование коарктации аорты

Спасибо за внимание!