Приволжский исследовательский медицинский университет

Невынашивание беременности на
фоне хронического эндометрита

Зав. кафедрой акушерства и
гинекологии д.м.н., профессор
Боровкова Л.В.

Привычное невынашивание беременности

Наличие в анамнезе у женщины подряд трех (двух) и более самопроизвольных прерываний беременности в сроке до 22 недель

Привычный выкидыш составляет 5-20% в структуре невынашивания беременности

Причины:

Объяснимые (50-60%)

- эндокринопатии (8 - 30%)
- анатомические (3 - 16%)
- генетические (3 - 6%)
- инфекция (2 - 45%)
- иммунологические (1 - 40%)

Необъяснимые (40-50%)

- ✓ недостаточная иммуносупрессия
- ✓ высокая активность иммунного ответа матери

Хронический эндометрит

Частота ХЭ у женщин репродуктивного возраста

10%

Частота ХЭ у женщин с бесплодием

12-68%

**Частота ХЭ у женщин с невынашиванием
беременности**

56-73%

Частота ХЭ при неудачных попытках ЭКО

До 60%

Шуршалина А.В. Хронический эндометрит как причина нарушений репродуктивной функции. Гинекология: журнал для практикующих врачей. 2012; 14(4): 16-18. doi: 10.1371/journal.pone.0214516.

Elweza AE, Ezz MA, Acosta TJ, Talukder AK, Shimizu T, Hayakawa H, et al. A proinflammatory response of bovine endometrial epithelial cells to active sperm in vitro. Mol Reprod Dev. 2018;85(3):215–26. PMID:29337420.

Современные особенности течения хронического эндометрита

- Скучная, неспецифическая симптоматика
- Увеличение этиологической значимости условно-патогенной микрофлоры и вирусов
- Рост резистентности к традиционным методам лечения
- Несоответствие клинических проявлений морфологическим изменениям
- Волнообразно-прогрессирующее течение
- Длительное течение

Патогенез хронического эндометрита.

Примечание.

EGF – эпидермальный фактор роста

Apo-protein – апо-белок

CD – cluster of differentiation, кластер дифференциации

TNF-α – фактор некроза опухоли α

TGF-β – трансформирующий фактор роста β

VEGF – сосудистый эндотелиальный фактор роста

ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение

ПЭ – перенос эмбрионов

Критерии диагностики

Клиническая картина

1. Тянущие боли внизу живота (50-56%).
2. Межменструальные и посткоитальные кровотечения (52-94%).
3. Обильное менструальное кровотечение.
4. Аменорея.
5. Бесплодие (67%).
6. Бессимптомное течение.

Ультразвуковая картина

1. Проводится на 5-7 и 22-25 дни цикла.
2. Участки повышенной эхогенности в структуре М-ЭХО.
 1. «Хвост кометы» от пузырьков газа.
 2. Гиперэхогенные включения в базальном слое эндометрия.
 3. Локальное расширение полости матки за счет анэхогенного содержимого.

Классификация эндометрита по этиологическому фактору

(Buckley С.Н., Fox Н., 2002)

Неспецифический	<p>Специфической флоры нет. Развивается на фоне:</p> <ul style="list-style-type: none">■ ВМС■ лучевой терапии■ при БВ■ при ВИЧ-инфекции
Специфический	<ul style="list-style-type: none">✓ Хламидийный (<i>Chlamydia trachomatis</i>).✓ Вирусный: ВПГ (66,2%), ЦМВ (20% - 36%), ВИЧ, энтеровирусы, ВПЧ (16, 18 серотипы).✓ Бактериальный: <i>Mycobact. tuberculosis</i>, <i>Neisseria gonorrhoea</i> и <i>meningitidis</i>, <i>Actinomyces israelii</i>, <i>Treponema pallidum</i>, <i>Mycoplasma hominis</i>.✓ Грибковый: <i>Candida</i>, <i>Blastomyces dermatitidis</i>, <i>Coccidioides immitis</i>, <i>Cryptococcus glabratus</i>.✓ Протозойный: <i>Toxoplasma gondii</i>, <i>Schistosoma haematobium</i>.✓ Паразитарный: <i>Enterobius vermicularis</i>.✓ Саркоидоз.

Методы оценки микрофлоры урогенитального тракта

Культуральный и микроскопический - классические лабораторные методы для оценки микрофлоры не всегда эффективны. Культуральные методы не всегда позволяют определить вид условно-патогенных бактерий (УПБ) - многие из них являются некультивируемыми или трудно культивируемыми.

Микроскопические методы зачастую низко-производительны и мало эффективны.

Технология ПЦР-РВ для определения ДНК УПБ позволяет выявлять различные бактерии, включая некультивируемые виды и проводить количественную оценку соотношения видов УПБ.

Такую возможность предоставляет диагностический комплекс **ИНБИОФЛОР** – предназначенный для оценки бактериальной микрофлоры УГТ.

ИНБИОФЛОР – модульный диагностический комплекс

Новые решения INVITRO для оценки биоценоза уrogenитального тракта

№3033 ИНБИОФЛОР-СКРИН:

- Исследование рекомендовано в качестве скрининга на наличие основных возбудителей инфекционно-воспалительных заболеваний, в том числе возбудителей ИППП, и для ориентировочной оценки состава и состояния микрофлоры уrogenитального тракта.

№3032 ИНБИОФЛОР-ЭКСПЕРТ:

- Расширенное комплексное исследование позволяет выявить основных возбудителей ИППП, оценить качественный и количественный состав микрофлоры уrogenитального тракта, определить количественное соотношение нормофлоры и условно-патогенных микроорганизмов, а также грибки рода *Candida* и провести их типирование.

№ 3033 ИНБИОФЛОР-СКРИН Выявляемые микроорганизмы

Контроль взятия материала (КВМ) и Общая бактериальная масса (ОБМ)

	Микроорганизмы		Микроорганизмы
Нормофлора	Лактобациллы, ДНК	Патогенная флора	Микоплазма генитальная, ДНК
	% Лактобацилл		Трихомонада, ДНК
Условно-патогенная флора	Гарднерелла, ДНК		Хламидия, ДНК
	Фунги (грибки), ДНК		Гонококк, ДНК
	Кандида альбиканс, ДНК		Вирус простого герпеса I, ДНК
	Уреаплазма уреалитикум, ДНК		Вирус простого герпеса II, ДНК
	Уреаплазма парвум, ДНК		Цитомегаловирус, ДНК
	Микоплазма гоминис, ДНК		

Что такое КВМ?

- **КВМ** (контроль взятия биологического материала) – ПЦР-исследование для оценки содержания эпителиальных клеток в образце. Содержание специфических участков ДНК человека в пробе прямо пропорционально количеству эпителиальных клеток.
- **КВМ** - это оценка правильности взятия соскоба эпителиальных клеток и исключение ложноотрицательных результатов исследования.
- Удовлетворительное значение КВМ – не менее 10 000 копий ДНК человека в пробе (**4Lg копий ДНК**). При меньшем количестве ДНК исследование может быть недостоверным.
- Если в графе «контроль взятия материала» стоит значение **4 lg и более** – предоставлен адекватный биологический материал.
- Если в графе «контроль взятия материала» стоит значение **менее 4 lg** – предоставлен биоматериал с недостаточным содержанием клеток и подсчет абсолютного и/или относительного количества микроорганизмов в биотопе может быть некорректным.

! **КВМ** = гарантия качества исследования

ФЕМОФЛОР-СКРИН, ИНБИОФЛОР-СКРИН, ИНБИОФЛОР-ЭКСПЕРТ – сравнение по составу

Фемофлор-Скрин	ИНБИОФЛОР-СКРИН	ИНБИОФЛОР-ЭКСПЕРТ
Контроль взятия материала (КВМ)	КВМ	КВМ
Общая бактериальная масса (ОБМ)	ОБМ	ОБМ
<i>Lactobacillus</i> spp.	<i>Lactobacillus</i> spp.	<i>Lactobacillus</i> spp.
<i>Gardnerella vaginalis</i>	<i>Gardnerella vaginalis</i>	<i>Gardnerella vaginalis</i>
<i>Candida</i> spp.	Fungi, <i>Candida albicans</i>	Fungi, <i>Candida albicans</i> (<i>Candida krusei</i> , <i>famata</i> , <i>parapsilosis</i> , <i>glabrata</i> , <i>guilliermondii</i> , <i>tropicalis</i>)
<i>Ureaplasma</i> spp.	<i>Ureaplasma urealyticum</i> , <i>Ureaplasma parvum</i> , <i>Mycoplasma hominis</i>	<i>Ureaplasma urealyticum</i> , <i>Ureaplasma parvum</i> , <i>Mycoplasma hominis</i>
<i>Prevotella bivia</i>		<i>Prevotella</i> spp.
<i>Porphyromonas</i> spp.		<i>Leptotrichia amnionii</i> group
		<i>Mobiluncus curtisii</i> , <i>Mobiluncus mulieris</i>
		<i>Atopobium vaginae</i>
<i>Trichomonas vaginalis</i>	<i>Trichomonas vaginalis</i>	<i>Trichomonas vaginalis</i>
<i>Chlamydia trachomatis</i>	<i>Chlamydia trachomatis</i>	<i>Chlamydia trachomatis</i>
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>
<i>Mycoplasma genitalium</i>	<i>Mycoplasma genitalium</i>	<i>Mycoplasma genitalium</i>
Cytomegalovirus	Cytomegalovirus	Cytomegalovirus
Herpes simplex virus 1 / 2	Herpes simplex virus 1 / 2	Herpes simplex virus 1 / 2

Классификация эндометрита

Морфологические варианты:

- Атрофический (атрофия желез, фиброз стромы, инфильтрация ее лимфоидными элементами).
- Кистозный (кисты, образовавшиеся вследствие сдавления протоков желез фиброзной тканью и сгущения их содержимого).
- Гипертрофический (ГПЭ, развившийся в результате хронического воспаления).

Гистологические критерии ХЭ

Аспирация ткани эндометрия проводится в пролиферативную фазу цикла (на 7-10 день).

Гистологическое исследование:

- скопление плазматических клеток
- воспалительная лимфоцитарная инфильтрация желез
- очаговый фиброз стромы
- склеротические изменения спиральных артерий.

Иммуногистохимическое исследование:

- увеличение экспрессии Ki-67 и Syndecan-1-CD-138 (маркер плазматических клеток)

Trimble CL, Method M, Leitao M, et al. Management of endometrial precancers. *Obstet Gynecol* 2012; 120:1160.

McQueen DB, Bernardi LA, Stephenson MD. Chronic endometritis in women with recurrent early pregnancy loss and/or fetal demise. *Fertil Steril* 2014; 101:1026.

Pitsos M, Skurnick J, Heller D. Association of pathologic diagnoses with clinical findings in chronic endometritis. *J Reprod Med* 2009; 54:373

АБ-терапия хронического эндометрита

Европа (IUSTI) , США (CDC), Великобритания (BASHH), Канада

- Цефтриаксон 250 мг в/м однократно
- Доксициклин 100 мг 2 раза в день 14 дней
- Метронидазол 400 мг 2 раза в день 14 дней

- Офлоксацин 400 мг 2 раза в сутки 14 дней или Левофлоксацин 500 мг 1 раз в день 14 дней
- Метронидазол 500 мг 2 раза в сутки 14 дней (Комбифлокс – Орнидазол 500 мг., Офлоксацин 200 мг.)

Великобритания

- Цефтриаксон 250 мг в/м однократно
- Азитромицин 1,0 г в нед, 2 нед. (Азитрокс)

Канада

- Азитромицин (Азитрокс) 250 мг в сутки в течение 7 дней или по 1,0 г в нед, 2 нед.
- Метронидазол по 500 мг 2 раза в сутки 14 дней

РЕЗОЛЮЦИЯ заседания СЭ

Согласно резолюции, «у пациенток, получающих препарат «Таржифорт», суппозитории вагинальные, в среднем на 1,3 суток быстрее купировался симптом «боль» и на 1 сутки быстрее купировался симптом «жжение». В обоих случаях различия были статистически значимы. Данный лекарственный препарат соответствует критериям современной терапии неспецифических вагинитов

Благодаря входящим в состав компонентам (хлорамфеникол, метронидазол, натамицин и гидрокортизона ацетат) препарат «Таржифорт», суппозитории вагинальные, обеспечивает широкий спектр этиотропных (противомикробное, противопротозойное, противогрибковое) и симптоматических (противовоспалительное, обезболивающее, противоэкссудативное, противоотечное и противозудное) эффектов

ОПУБЛИКОВАНО: Журнал «Акушерство и гинекология», №11, 2020

«Применение нового комбинированного топического препарата для лечения вагинитов различной этиологии». 17.12.2020. РЕЗОЛЮЦИЯ МЕДИЦИСЦИПЛИНАРНОГО СОВЕТА ЭКСПЕРТОВ, ПОСВЯЩЕННОГО ПРОБЛЕМЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ВАГИНИТОВ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ.

<https://aig-journal.ru/content/news/Primenenie-novogo-kombinirovannogo-topicheskogo-preparata-dlya-lecheniya-vaginitov-razlichnoi-etologii.html>

РЕЗОЛЮЦИЯ
междисциплинарного совета экспертов, посвященного проблеме диагностики и лечения вагинитов различной этиологии в условиях реальной клинической практики
«Применение нового комбинированного топического препарата для лечения вагинитов различной этиологии – «ОРИГИНАЛ»

Участники Экспертного совета и авторы Резолюции:

Сулик Геннадий Тихонович — академик РАН, доктор медицинских наук, Заслуженный деятель науки РФ, профессор, директор ФБУ «ФМБЦ АПТ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии ИПО ФГБОУ ВО «Первый ММУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, (Москва).

Серов Владимир Николаевич — академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Президент Российского общества акушеров-гинекологов, (Москва).

Баранов Игорь Иванович — доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом научно-образовательных программ ФБУ «ФМБЦ АПТ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, (Москва).

Аполонина Илона Анатольевна — доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделом акушерской гинекологии и реабилитации ФБУ «ФМБЦ АПТ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, профессор кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии ИПО ФГБОУ ВО «Первый ММУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, Президент Ассоциации специалистов по акушерской гинекологии (АСГ) и Европейской ассоциации гинекологической помощи и пластической хирургии (EAGAP), (Москва).

Ранатукина Маргарита Рафиковна — доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии с курсом клинической и лабораторной диагностики ИПО ФГБОУ ВО «ФМБЦ АПТ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, (Москва).

Прутунович Татьяна Валерьевна — доктор медицинских наук, заведующий отделом микробиологии, клинической фармакологии и эпидемиологии ФБУ «ФМБЦ АПТ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, (Москва).

Павлов Станислав Владиславович — кандидат медицинских наук, доцент, научный секретарь ФБУ «ФМБЦ АПТ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, профессор кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии ИПО ФГБОУ ВО «Первый ММУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России, (Москва).

Зарина Сергей Константинович — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии ФГБОУ ВО «Российский Университет Дружбы Народов», заместитель главы кафедры ИИ 24 Д1 Москва, (Москва).

Камнев Николай Николаевич — доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой клинической гинекологии, аллергологии и иммунологии СГМУ им. И.И. Мечникова, (Санкт-Петербург).

Буркина Ольга Игоревна — доцент, кандидат медицинских наук, заведующий учебной частью кафедры общей и клинической фармакологии ФГБОУ ВО «Российский Университет Дружбы Народов», (Москва).

Коллектив участников, под председательством академика Сулика Геннадия Тихоновича, академика Серова Владимира Николаевича, профессора Аполониной Илоны Анатольевны:

1. Авад, Серов В. Н. Кандидаты: современные аспекты этио-патогенеза и подходов к лечению.
2. Проф. Баранов И.И. Кандидаты: современные аспекты этио-патогенеза и подходов к лечению.
3. Проф. Аполонина И.А. Вагиниты, вызванные различной флорой: современные подходы и этио-патогенез и лечение.
4. Проф. Ранатукина И.Р. Вагиниты — неспецифические проблемы. Вопросы дифференциальной диагностики.
5. Проф. Прутунович Т.В. Современные аспекты диагностики инфекций женских половых путей.
6. Проф. Зарина С.К. Метронидазол и кларифенитол — сравнительные подходы и терапия вагинальных вагинитов.
7. Проф. Камнев И.И. Натамицин — сравнительные подходы к терапии кандидозов.
8. К.м.н. Буркина О.И. Противовоспалительные свойства гидрокортизона ацетата.
9. Проф. Аполинина И.А. Применение «Нового комбинированного топического препарата для лечения вагинитов различной этиологии» — «ОРИГИНАЛ»

Было сделано заключение, что вагиниты, кандидозные и трихомонадные вагиниты, являются неоднородной проблемой современной гинекологической практики, так и лечебные подходы к ним. В этой связи, большое значение имеет разработка новых препаратов для локального интравагинального применения средств — препараты местного и системного действия.

Особое внимание является исследованием комплексных комбинированных препаратов, включающих в себя этиотропные и симптоматические компоненты. Так, важное значение имеет не только этиотропный, но и противовоспалительный компонент терапии, так как воспаление является центральным звеном патогенеза вагинитов, купирование этого звена комплексного действия является важным шагом в решении данной проблемы, которая с годами не теряет своей актуальности. Основным условием является система препарата, а также его лекарственная форма, в том числе входящие в его состав вспомогательные вещества.

Одним из новых препаратов является комбинированный препарат «Таржифорт», суппозитории для интравагинального применения. В состав препарата вошли метронидазол, кларифенитол, натамицин и гидрокортизон ацетат. Фармакологической основой является уникальный комплекс полифункциональных обезболивающих, противовоспалительных и спазмолитических средств, что придает препарату комплексный эффект. Кроме того, местное противовоспалительное действие усиливается входящими активными компонентами препарата на всех участках слизистой оболочки влагалища.

Препарат отличается наличием комбинации компонентов. В частности, комбинация кларифенитола и метронидазола обеспечивает широкий спектр и локальный противовоспалительный эффект, что позволяет избежать системного действия данных антибиотиков и антигистаминных средств, так и избежать трихомонадной этиологии. При этом, препарат не сопряжен со значимым всасыванием в системный кровоток, что позволяет избежать системного действия данных антибиотиков и антигистаминных средств и системного действия данных антибиотиков и антигистаминных средств, так и избежать трихомонадной этиологии. При этом, препарат не сопряжен со значимым всасыванием в системный кровоток, что позволяет избежать системного действия данных антибиотиков и антигистаминных средств и системного действия данных антибиотиков и антигистаминных средств, так и избежать трихомонадной этиологии.

С учетом данных, полученных в ходе регистрационного исследования, считаем возможным рекомендовать препарат «Таржифорт» (вагинальные суппозитории) для терапии и профилактики вагинитов.

ТАРЖИФОРТ® суммарное действие компонентов

1

Метронидазол:

противомикробный и противопротозойный препарат, производное 5-нитроимидазола

Механизм действия:

восстановленная 5-нитрогруппа взаимодействует с ДНК клеток микроорганизмов, ингибируя синтез их нуклеиновых кислот, что ведет к гибели бактерий

2

Хлорамфеникол:

антибиотик широкого спектра действия, бактериостатик

Механизм действия:

подавление синтеза белков микроорганизма, за счет связывания субъединицы 50S рибосом и прекращения процесса формирования пептидной цепи

3

Натамицин:

полиеновый антибиотик из группы макролидов с широким спектром действия

Механизм действия:

Связывает стеролы клеточных мембран грибов, нарушая их целостность и функции, что приводит к изменению проницаемости клетки и её гибели (фунгицидное действие). При интравагинальном применении не абсорбируется – нет системного действия. Резистентность к натамицину в клинической практике не встречается

4

Гидрокортизон:

глюкокортикостероид

Механизм действия:

оказывает противовоспалительное действие – обезболивающее, антиэкссудативное, противоотечное, противозудное

ТАРЖИФОРТ® – ШИРОКИЙ СПЕКТР ЛЕЧЕНИЯ В ОДНО НАЗНАЧЕНИЕ

ТАРЖИФОРТ® СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ с целью лечения и профилактики вагинитов

Интравагинально

Лечение: по 1 суппозиторию 1 раз в сутки перед сном 10 дней
Профилактика: режим дозирования по назначению врача

Суппозиторий следует вводить глубоко во влагалище, в положении лежа на спине

Во время лечения препаратом Таржифорт рекомендуется воздерживаться от половых контактов

Повторные курсы лечения возможны после консультации с врачом

Во время лечения и в течение 48 ч после прекращения лечения, следует воздержаться от приема алкоголя (этанола) или лекарств, которые содержат этанол

ТАРЖИФОРТ® может применяться

В амбулаторной практике	При вмешательствах на органах малого таза
Зульвовагиниты бактериальной, кандидозной и трихомонадной этиологии	Профилактика урогенитальных инфекций/вагинитов перед гинекологическими операциями
Смешанные вагиниты	Профилактика урогенитальных инфекций/вагинитов перед диагностическими операциями
При необходимости для эмпирической терапии вагинальной инфекций , вызванной полимикробными ассоциациями/сочетанной флорой (за счет широкого спектра действия)	Профилактика урогенитальных инфекций/вагинитов перед внутриматочными манипуляциями

Применение нового комбинированного препарата для местного применения для лечения вагинитов различной этиологии «ОРИГИНАЛ»

Скорость исчезновения симптомов, дни

Число пациенток с отсутствием симптомов через 14 дней после лечения, %

Симптомы БОЛЬ и ЖЖЕНИЕ были купированы достоверно БЫСТРЕЕ в группе ПАЦИЕНТОК, получавших препарат ТАРЖИФОРТ® *

ВЫВОДЫ: полученные данные позволяют рекомендовать препарат ТАРЖИФОРТ® российского производства для терапии вагинитов различной этиологии в качестве эффективного лекарственного средства

И.А. АПОЛИХИНА, А.С. САИДОВА, И.А. КУЛИКОВ, И.И. БАРАНОВ. Применение нового комбинированного препарата для местного применения (метронидазол + хлорамфеникол + натамицин + гидрокортизона ацетат) для лечения вагинитов различной этиологии, Акушерство и гинекология; 2020; 5: 158 – 165

ЖИФОРТ® ОСНОВА ДЛЯ СУППОЗИТОРИЕВ – ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ ГЛИЦЕРИДЫ – СУППОЦИР АМ

Suppocire® AM

- обеспечивает расплавление суппозитория под действием температуры тела с образованием объемной пенистой массы
- равномерно распределяет действующее вещество по слизистой оболочке с проникновением в труднодоступные складки влагалища
- обеспечивает высокие биоадгезивные и мукоадгезивные свойства действующего вещества*

СУППОЦИР АМ – оптимальная основа для суппозитория, так как температура плавления СУППОЦИР АМ находится в диапазоне температуры тела человека

*Тютюнник В.Л. «Эффективность и комплаентность терапии вульвовагинального кандидоза при беременности», РМЖ Акушерство и Гинекология 2018, №2
Инструкция по медицинскому применению

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ **МЕТРОМИКОН-НЕО®** У ПАЦИЕНТОК С БВ* схема: 14 дней по 1 супп. утром и вечером

До лечения

Таблица 2. Данные микроскопического исследования до лечения БВ

Table 2. Microscopic examination prior to the treatment of BV

Показатели Indicators	Встречаемость, n (%) Occurrence, n (%)
Эпителий (большое количество) Epithelium (large amount)	5 (12,5)
Микрофлора (обильная): кокки, кокко-бациллярная Microflora — abundant cocci, cocco-bacillary	35 (87,5)
Ключевые клетки Clue cells	30 (75)

После лечения

Таблица 4. Данные микроскопического исследования после лечения БВ

Table 4. Data of microscopic examination after treatment of BV

Показатели Indicators	Встречаемость, n (%) Occurrence, n (%)
Эпителий (большое количество) Epithelium (large amount)	0
Микрофлора (обильная): кокки, кокко-бациллярная Microflora — abundant cocci, cocco-bacillary	2 (5)
Ключевые клетки Clue cells	1 (2,5)

- Данные микроскопических исследований **нормализовались в 94,2%** случаев
- После 14 дней применения Метромикон-Нео® у пациенток рН влагалища $\leq 4,5$
- По данным микроскопического исследования мазков влагалища наблюдалась **нормализация микрофлоры**

*БВ – бактериальный вагиноз

Ю.Э. Доброхотова, И.И. Иванова «Использование комбинации метронидазола и миконазола в коррекции дисбиоза влагалища», РМЖ. Мать и дитя, 2018 Т.1, №1

ПО ДАННЫМ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ У 90% ПАЦИЕНТОК С БВ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ БИОПЛЕНКИ!

- Патогенные микроорганизмы образуют биоплёнки при соприкосновении, за счёт создания изолированных сообществ особого матрикса и объединения в общую структуру
- Биоплёнки при БВ плотно прикреплены к поверхности эпителия влагалища, имеют высокую степень организации
- В биоплёнках бактерии защищены от фагоцитоза и других компонентов врождённого и приобретённого иммунитета
- До 80% всех бактериальных инфекций человека связаны с образованием биоплёнок, в т. ч. биоплёнки играют определённую роль в развитии БВ

При хроническом рецидивирующем течении БВ исход терапии во многом зависит от восстановления локальных защитных сил и от воздействия на биоплёнку!*

* Пестрикова Т.Ю. «Современные подходы к верификации диагноза бактериального вагиноза и тактике ведения», РМЖ Акушерство и Гинекология 2018, №2

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ, ТРИХОМОНИАЗ: ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРЕПАРАТА

Состав комбинированного препарата Метромикон-Нео®	Схема лечения
Метронидазол 500 мг + миконазол 100 мг Вспомогательное вещество: основа Суппоцир АМ	По 1 свече 2 раза/день 7 – 14 дней

Действие:

- Противомикробное
- Противогрибковое
- Противопротозойное

Показания:

- Бактериальный вагиноз
- Вульво-вагинальный кандидоз
- Трихомонадный вагинит
- Вагиниты, вызванные смешанными инфекциями

При **острых** формах заболевания на курс необходима - 1 упаковка препарата Метромикон-Нео®
При **хронических** формах заболевания на курс необходимы - 2 упаковки препарата Метромикон-Нео®

Динамика изменения количества лактобактерий и условно-патогенной микрофлоры у пациенток до и после терапии препаратом метронидазол + миконазол

Нормальный титр лактобактерий сохранялся у 62 % пациенток к концу наблюдения (6 мес.)

Исследование показало устойчивое снижение количества патогенных микроорганизмов:
Gardnerella vag., *Atopobium vag.* и *Mobiluncus spp.*

Комбинация Проваг капсулы + Проваг гель показала наибольшую эффективность в восстановлении лактофлоры влагалища при НВВ

Количество пациенток (%), достигших нормобиоциноза (содержание лактобактерий во влагалище более 80%) в результате II этапа лечения НВВ про- и метабиотиком Проваг по данным ПЦР

КЛАССИФИКАЦИЯ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИХ СРЕДСТВ (по К. Noel Masihi, 2000)

- 1 Эндогенные вещества и их синтетические аналоги (цитокины: природные интерлейкины – суперлимф; рекомбинантные интерфероны, иммунорегуляторные пептиды, иммуноглобулины)
- 2 Экзогенные вещества и их синтетические аналоги (бактериального происхождения, **растительного происхождения – иммуномакс**; РНК-дрожжевого происхождения – ридостин; ДНК- животного происхождения – дезоксирибонуклеат натрия)
- 3 Синтетические, химически чистые вещества (синтетические иммуномодуляторы разных групп – алдара, инозин пранобекс, аминодигидрофталазиндион натрия, азоксимера бромид; пептидные иммуномодуляторы – **гепон**, аллоферон, аргинил-альфа-аспартил-лизил-валил-тирозил-аргинин; индукторы интерферона – тилорон, оксодигидроакридинацетат натрия, меглюмина акридонацетат; иммунодепрессанты)

Цитокины - регуляторные белки иммунной системы

Цитокины координируют все этапы развития воспаления и адекватность ответа на внедрение инфекта, обеспечивая его удаление, а затем и полноценную регенерацию поврежденных структур тканей.*

Воспалительные цитокины :

- ✓ координируют клеточные взаимодействия,
- ✓ регулируют миграцию клеток в очаг воспаления,
- ✓ их активацию и превращение в эффективные клетки,
- ✓ стимулируют заживление.
- ✓ предупреждают рецидив инфекции, связанный с дисбалансом иммунного состояния.

Суперлимф® настраивает физиологический иммунный ответ за счет балансирования про- и противовоспалительных цитокинов, а главное предупреждает рецидив инфекции, связанный с дисбалансом иммунного состояния.**

*«Цитокины».С.А.Кетлинский, А.С.Симбирцев СПб, Издательство ООО «Фолиант» 9-13

**Л.В.Ковальчук,Ю.Э.Доброхотова,Л.В.Ганковская,Н.В.Кореева/Применение препарата «Суперлимф» в лечении гинекологической патологии / Москва - 2011

Механизм действия локальной цитокинотерапии (Суперлимф®)

- активация клеток фагоцитарного ряда, фибробластов и усилением взаимодействий между этими клеточными элементами.
- стимуляция фагоцитоза макрофагов и нейтрофилов, выработка ими активных форм кислорода и азота
- повышение продукции клетками собственных цитокинов, регуляция их миграции
- активация противоопухолевой цитотоксичности

В то же время локальная цитокинотерапия регулирует функциональную активность фибробластов, синтез ими коллагена и гликозаминогликанов.

ИССЛЕДОВАНИЕ

«Возможности цитокинотерапии при хроническом эндометрите»

Выборочная совокупность n=58

Этап включения в исследование

Аспирационная биопсия эндометрия:
ИГХ, ПЦР-РТ, реакция обратной транскрипции,
микробиология

**Назначение препарата Суперлимф 25 ЕД
по 1 свече во влагалище 20 дней**

Через 20 дней

Аспирационная биопсия эндометрия:
ИГХ, ПЦР-РТ, реакция обратной транскрипции,
микробиология

Цель ИССЛЕДОВАНИЯ:

Повышение эффективности терапии хронического эндометрита путем модулирования локальной экспрессии факторов врожденного иммунитета

Рецептивность эндометрия

Фактор	Основная группа (n=43)		Группа сравнения (n=15)
	До	После	
Оценка рецептивности эндометрия			
Пиноподии, %	44,9±12,4	56,3±6,9	61±10,5
Er стромы	25,9±7,9	81,8±11,6	67,5±12,1
Er эпителия	32,3±6,2	96,9±9,2	74±18,6
Rr стромы	47,1±4,9	129,7±15,1	131,5±12,2
Rr эпителия	35,3±7,1	107,8±22,8	108,3±25,1

- ↑ числа пиноподий в **1,27** раз
 - в эпителии: ↑ экспрессии RE в **1,3** раза, RP в **3** раза
 - в стромальных клетках:
 ↑ экспрессии RE в **3,25** раза, RP в **2,7** раза.

Инфекционные факторы

Инфекционные агенты (всего случаев, %)

	До	После
ЦМВ	0	1 (2,3%)
ВПЧ	2 (4,65%)	0
Вирус Эпштейна Барр	24 (55,81%)	11 (25,58%)
HSV I	3 (6,95%)	20 (46,51%)
HSV II	11 (25,58%)	13 (30,23%)

- До начала лечения вирус Эпштейна Барр выявлялся у 55,8%
- После курса терапии частота вируса Эпштейна Барр снизилась в **2,18 раз**.

Из 24 пациенток с вирусным эндометритом гистологическое и иммуногистохимическое излечение наступило у 45,8%.

маркеры хронического эндометрита

Маркеры хронического эндометрита (качественно, %)			
	ДО	ПОСЛЕ	НОРМА
CD138	27 (62,8%)	17 (39,5%)	3 (6,9%)
CD20	23 (53,5%)	16 (37,2%)	2 (4,7%)
CD8	24 (55,8%)	27 (62,8%)	4 (9,3%)
CD4	24 (55,8%)	41 (95,3%)	4 (9,3%)
CD56	22 (51,2%)	23 (53,5%)	4 (9,3%)
HLA-DRII	24 (55,8%)	35 (81,4%)	3 (6,9%)

- CD 138 - детекция снижается в 1,6 раз.
- В-лимфоциты (CD20) -снижается в 1,4 раза.

восстановление рецептивности эндометрия на фоне лечения Суперлимфом

Фактор	Основная группа (n=43)		Группа сравнения (n=15)
	До	После	
Оценка рецептивности эндометрия			
Пиноподии, %	44,9±12,4	56,3±6,9	61±10,5
Er стромы	25,9±7,9	81,8±11,6	67,5±12,1
Er эпителия	32,3±6,2	96,9±9,2	74±18,6
Pr стромы	47,1±4,9	129,7±15,1	131,5±12,2
Pr эпителия	35,3±7,1	107,8±22,8	108,3±25,1

- Увеличение числа пиноподий в 1,27раз
- в эпителии: повышение экспрессии RE в 1,3 раза, RP в 3 раза
- в стромальных клетках: повышение экспрессии RE в 3,25 раза, RP в 2,7 раза.

Спонтанная беременность наступила у 44,2% пациенток в течение 4 месяцев

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ УНИКАЛЬНЫ

- коррекция иммунитета при лечении инфекционных заболеваний должна касаться звеньев, играющих ключевую роль¹.
- при лечении больного инфекционным заболеванием нельзя стимулировать иммунитет вообще, активация иммунитета должна быть нацелена на те механизмы иммунитета, которые эффективны в защите от данной инфекции¹.

Клиническая эффективность иммуномодуляторов при лечении четырех различных инфекционных заболеваний

Иммуномодулятор	Герпес простой 1-го или 2-го типа		ВПЧ	Гнойная бактериальная инфекция		Кандидоз
	Острая фаза	Рецидивирование		I фаза	II фаза	
Гепон [▲]	+++	+	+	+	+++	+++
Иммуномакс [▲]	+	+++	+++	+++	++	+

1. Хаитов Р.М., Атауллаханов Р.И., Шульженко А.Е. Иммуноterapia. Руководство для врачей. 2-е издание, переработанное и дополненное. ГЭОТАР-Медиа, 2018 г.

ИММУНОМАКС® включен в Алгоритм лечения заболеваний, ассоциированных с папилломавирусной инфекцией, остроконечных кондилом¹

Лечение:

- Иммуномакс 200 ЕД – в сочетании с хирургическим лечением, внутримышечно, один раз в день – в 1, 2, 3, 8, 9, 10 дни лечения.
- Далее с трехкратным повторением курса с интервалом в 1 месяц. Перед употреблением препарат растворяют в 1 мл воды для инъекций

Профилактика рецидивов:

Применение иммуномодулирующих препаратов: Иммуномакс 200 ЕД

Для лечения рецидивирующих аногенитальных бородавок курс Иммуномакс состоит из 6 инъекций по 200 ЕД по схеме:

1, 2, 3, 8, 9, 10 дни лечения

Алгоритмы диагностики и лечения. Приложение № 6/2020

В.Н. ПРИЛЕПСКАЯ, П.Р. АБАКАРОВА, Э.Р. ДОВЛЕТХАНОВА
КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, ОСТРОКОНЕЧНЫХ КОНДИЛОМ
 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский Центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.П. Волкова» Минздрава России, Москва, Россия

Папилломавирусная инфекция (ПВИ) – одна из самых распространенных инфекций в современном мире. Известно, что вирус папилломы человека (ВПЧ) является основной причиной заболеваний шейки матки, влагалища, вульвы, уретры и ротоглотки, генитальных бородавок [1].

Коды по МКБ-10

- B07.7 Папилломавирусная инфекция
- D06.0 Аногенитальные (генерализованные) бородавки
- D06.8 Другие доброкачественные новообразования шейки матки (полаяя кондилома)
- N87.0 Дисплазия шейки матки
- N87.0 Слабовыраженная дисплазия шейки матки
- N87.1 Умеренная дисплазия шейки матки
- N87.2 Резко выраженная дисплазия шейки матки, не классифицированная в другой рубрике
- N87.9 Дисплазия шейки матки неуточненная

КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ (взрывные новорожденным глазом) [2]:

- **жидкофазная форма**
- **СУБКЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ** (на видные новорожденным глазом, бессимптомные, выявляемые только при кольпоскопии и/или цитологическом, гистологическом исследовании):
 - плоские кондиломы (типичная структура с множественными коилотитами);
 - малые формы (различны изменением многоствольного плоского и метастазического эпителия с единичными коилотитами);
 - интравитреальные кондиломы с локализацией в кристаллах;
 - кондиломатозный цервицит и вагинит;
- **ЛАТЕНТНЫЕ ФОРМЫ** (обнаруживаются ДНК ВПЧ молекулярно-генетическими методами без микроскопического признака ПВИ).

Аногенитальные (генерализованные) бородавки – вирусное заболевание, обусловленное ВПЧ и характеризующееся появлением на жидких участках на коже и слизистых оболочках наружных половых органов, уретры, влагалища, шейки матки, периферической области [3]. Это наиболее распространенная клиническая форма ПВИ. По данным МЗ РФ, частота заболеваемости в 2018 г. составила 18,9 на 100 тыс. населения, в Москве – 14,9 на 100 тыс. населения [4].

Алгоритмы диагностики и лечения. Приложение № 6/2020

МКБ-10: A63.0 Аногенитальные (генерализованные) бородавки	
Возбудитель	<p>ВПЧ низкого онкогенного риска, чаще всего 6 и 11 типа, а также 40, 42, 43, 44, 54, 56, 61, 72, 81 типа</p> <ul style="list-style-type: none"> - Остроконечные кондиломы - Бородавки в виде папул - Поражения в виде папул - Вульварно-вагинальные кондиломы - Болезнь Рейтера и болезнь Боуэна, гигантские кондиломы Буша-Генриетта
Клиническая картина	<ul style="list-style-type: none"> - Мелкие образования в виде папул, папиллом на коже и слизистой НПО. - Эрозия и паракератоз в области поражения. - Болезненность во время половых контактов (диспаруния). - При локализации в области уретры – зуд, жжение, болезненность при мочеиспускании. - Болезненные трещины и кровоточивость шейки матки и слизистой оболочки в местах поражения.
Жалобы и клиническая картина	<p>Диагноз, как правило, ставится клинически на основании визуального осмотра [5].</p> <p>Для верификации диагноза могут использоваться:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширенная кольпоскопия (КВП), автоскопия; - микроскопический метод, позволяющий идентифицировать генотип ВПЧ; - цитологическое исследование; - микробиологические исследования (биопсия (по показаниям)). <p>Диагноз может быть подтвержден с помощью биопсии, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> - диагноз не ясен; - поражение обширное; - у пациентки имеется иммунодефицит; - бородавки множественные, стойкие, рецидивирующие и/или определяются кровоточивостью при пальпации бородавок.
Материал для исследования	<p>Способны с пораженными участками, слизистой оболочки уретры, влагалища, шейки матки для определения ДНК ВПЧ молекулярно-генетическими методами (полимеразная цепная реакция и реакция реального времени) [5, 7].</p>
Лечение	<p>Деструкция кондиломатозных образований и этиопатогенное лечение [2, 6, 8].</p> <ul style="list-style-type: none"> - Хирургические и физические методы: <ul style="list-style-type: none"> - криодеструкция; - лазеротерапевтические методы (диатермоэлектрокоагуляция); - радиоволновая хирургия; - криотерапия; - лечение СО₂-лазером. - Химические: <ul style="list-style-type: none"> - 1-3% раствор уксусной кислоты/трихлоруксусной кислоты; 2-хлорпропионовая кислота – средство для местного применения; нанесение на высыпания однократно до изменения окраски тканей на сероватобелый. В ряде случаев для достижения полной коагуляции лучше аномаличные бородавки, требуется проводить до 3 сеансов с интервалом в 10-14 дней; - комбинация азотной, уксусной, щавелевой, молочной кислот и тетрациклина метила гидрохлорида. Раствор наносится однократно, непосредственно на кондилому. Перерыв между процедурами 10-14 дней.

акушерства
гинекологии

1. Прилепская В.Н., Абакарова П.Р., Довлетханова Э.Р. Клиника, диагностика и лечение заболеваний, ассоциированных с папилломавирусной инфекцией. Остроконечные кондиломы. Алгоритмы диагностики и лечения. Приложение № 6/2020 журнала «Акушерство и гинекология»

МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ

ИММУНОМАКС

АКТИВИРУЕТ КЛЕТКИ И ФУНКЦИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ¹

- НК-клетки
- Моноциты
- Макрофаги
- Нейтрофилы
- Антитела

- ◆ Ускоренное клиническое выздоровление²
- ◆ Сокращение количества рецидивов²
- ◆ Преодоление резистентности к лекарственным препаратам²

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Иммуномакс®, РУ № Р N001919/02

2. Хаитов Р.М., Атауллаханов Р.И., Шульженко А.Е. Иммунотерапия.

Руководство для врачей. 2-е издание, переработанное и дополненное. ГЭОТАР-Медиа, 2018 г.

ИММУНОМАКС®

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ВПЧ-ИНФЕКЦИИ

Иммуномакс 200 ЕД в/м №6*

Клинические проявления

Иммуномакс 200 ЕД в/м №6*

Элиминация вируса

■ ВПЧ высокого риска
■ ВПЧ низкого риска

ДНК-ВПЧ
(% больных)

Иммуномакс у 97% больных прекращает рецидивный рост кондилом, вызванный вирусом папилломы человека. Курс инъекций Иммуномакса по 200 ЕД внутримышечно №6 в сочетании с деструкцией кондилом приводит к элиминации вируса папилломы человека у половины инфицированных.

1. Перламутров Ю.Н., Соловьев А.М., Атауллаханов Р.Р., и др. Применение активатора противовирусного иммунитета в комплексной терапии рецидивирующих остроконечных кондилом. Иммунопатология, аллергология, инфектология, 2003, №3, с.138-141.
2. Тищенко А.Л.,Сергеева Н.С.,Кралин М.Ю. Иммуномакс в терапии рецидивирующей генитальной папилломавирусной инфекции. Русский медицинский журнал, 2003, Том 11, № 27, с.1526-1527.

* Согласно инструкции по медицинскому применению препарата Иммуномакс, РУ № Р N001919/02

Связь вида Candida с тяжестью клинического течения

Неосложненный ВВК	Осложненный ВВК
Спорадический или нечастый	Возвратный, рецидивирующий
И	ИЛИ
От легкого до умеренно тяжелого течения	Тяжелое течение При тяжелом течении ВВК наблюдается обширная вульварная эритема, отек, эксфолиация и образование трещин
И	ИЛИ
Преимущественно Candida albicans	Candida non-albicans этиологии
И	ИЛИ
Иммунокомпетентные лица	Женщины с диабетом, иммунодефицитными состояниями (например, ВИЧ-инфекцией), изнурением или иммуносупрессивной терапией (например, кортикостероидами)

Предпосылки для назначения местных иммуномодулирующих средств при РВВК

- Исследования in vitro обнаружили, что **иммунитет против Candida** опосредован не системной защитой хозяина, а **локальным приобретенным иммунитетом слизистой оболочки** [3,4].
- **Ведущее значение** в развитии рецидивирующих форм УГК придают **локальным иммунным нарушениям** [2]
- Проведение **системной иммуномодулирующей терапии** у пациенток с рецидивирующим вульвовагинальным кандидозом не целесообразно (С) [1].

1. Федеральные клинические рекомендации диагностика и лечение заболеваний, сопровождающихся патологическими выделениями из половых путей женщин. Российское общество акушеров-гинекологов ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И.Кулакова» МЗ РФ. Москва, 2013 год.
2. Федеральные клинические рекомендации по ведению больных урогенитальным кандидозом. Российское общество дерматовенерологов и косметологов. Российское общество акушеров-гинекологов. Москва – 2015.
3. Willems HME, Ahmed SS, Liu J, Xu Z, Peters BM. Vulvovaginal Candidiasis: A Current Understanding and Burning Questions. J Fungi (Basel). 2020;6(1):27. Published 2020 Feb 25.
4. Talaei Z, Sheikbahaei S, Ostadi V, et al. Recurrent Vulvovaginal Candidiasis: Could It Be Related to Cell-Mediated Immunity Defect in Response to Candida Antigen?. Int J Fertil Steril. 2017;11(3):134-141.

Непон = НЕР-1

human ezrin peptide – пептид человеческого эзрина

Элементы цитоскелета клетки

Роль эзрина в регуляции приобретенного иммунитета

Эзрин способствует реорганизации цитоскелета лимфоцитов, что обеспечивает их миграцию из очага инфекции в кровотоки и обратно для реализации хоуминг-эффекта, то есть концентрации лимфоцитов в очаге инфекции с целью эрадикации возбудителя.

1. Pore D, Gupta N. The ezrin-radixin-moesin family of proteins in the regulation of B-cell immune response. *Crit Rev Immunol.* 2015;35(1):15-31.
2. Супрун Е.Н. Рециркуляция лимфоцитов // Аллергология и Иммунология в Педиатрии. 2014. №1 (36).

Этиологическая и клиническая эффективность терапии препаратом Гепон у женщин с рецидивирующим вульвовагинальным кандидозом (РВВК) в анамнезе, устойчивым к стандартной терапии

Динамика микробиологической эффективности терапии Гепоном у больных РВВК (n=70)

Через 1 месяц после лечения препаратом Гепон у пациентов с РВВК в анамнезе **клинические признаки кандидоза*** отсутствовали в **90% случаев**, нити псевдомицелия в мазках отсутствовали в **93% случаев**

*клинические признаки воспаления слизистой оболочки влагалища и кожи крайней плоти (краснота, отечность), мацерации, сухость слизистой оболочки, творожистые выделения

Тищенко А.Л. Гинекология. М.: Медиа Медика, 2001; 3(6): 210–2.

Этиологическая и клиническая эффективность терапии препаратом Гепон у пациентов с рецидивирующим вульвовагинальным кандидозом (РВВК) в анамнезе, устойчивым к стандартной терапии

Динамика клинического и микробиологического выздоровления у больных РВВК

Через 1 месяц после лечения препаратом Гепон у пациентов с РВВК в анамнезе

клинические признаки кандидоза*

отсутствовали в 90% случаев, нити псевдомицелия были обнаружены в 16% случаев

*клинические признаки воспаления слизистой оболочки влагалища и кожи крайней плоти (краснота, отечность, болезненность и зуд)

1. Хаитов Р.М., Атауллаханов Р.И., Шульженко А.Е. Иммуноterapia. Руководство для врачей. 2-е издание, переработанное и дополненное. ГЭОТАР-Медиа, 2020 г.

Эффекты применения Гепона при рецидивирующем вульвовагинальном кандидозе

- Гепон был эффективен в отношении сухости слизистых оболочек влагалища¹
- У пациенток, получавших Гепон, было отмечено удлинение безрецидивного периода до 1,5 лет²

1. Тищенко А.Л. Гинекология. М.: Медиа Медика, 2001; 3(6): 210–2.

2. Шабашова Н. В., с соавт. Нарушения местного иммунитета и иммунотерапия гепоном при хроническом воспалении слизистых оболочек разной локализации // Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. 2010. №4.

Точки приложения препарата Гепон на факторы врожденного иммунитета, играющие важную роль при РВБК

КОМПОНЕНТЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ		ДЕЙСТВИЕ ГЕПОНА
Компоненты врожденного иммунитета	Физические компоненты: эпителиальный барьер и слизь	Показан для уменьшения сухости слизистых оболочек ¹ . Является индуктором заживления эрозий, язв и ран ² . Показана высокая эффективность местного применения этого препарата для лечения незаживающих эрозий и язв, в том числе при ВВК ³⁻⁶ .
	Химические компоненты: цитокины, антимикробные пептиды и т.д.	Вызывает продукцию альфа- и бета-интерферонов ¹ Ограничивает выработку провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, -6, -8 и ФНО-α) ¹
	Клеточные компоненты: нейтрофилы, макрофаги, дендритные клетки, НК-клетки	Повышает функциональную активность нейтрофилов ¹ Мобилизует и активирует макрофаги ¹ Увеличивает содержание НК-клеток ¹

1. Инструкция по медицинскому применению препарата ГЕПОН®, РУ Р N000015/01
2. Чулкина М.М., с соавт. Иммунология. 2017. №4.
3. Тищенко А.Л. Гинекология. М.: Медиа Медика, 2001; 3(6): 210–2.

4. Бардычев М.С. Лечащий врач. 2003; 5: 78–9.
5. Дудченко М.А., с соавт. Лечащий врач. 2002; 10: 72–5.
6. Лазебник Л.Б., с соавт. Русский медицинский журнал. 2004; 12(23): 1349–52.

Точки приложения препарата Гепон на факторы приобретенного иммунитета, играющие важную роль при РВБК

КОМПОНЕНТЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ		ДЕЙСТВИЕ ГЕПОНА
Компоненты приобретенного иммунитета	В-лимфоциты	Стимулирует продукцию антител к различным антигенам инфекционной природы ¹
	Т-лимфоциты	Увеличивает содержание CD4+Т-лимфоцитов ¹

1. Инструкция по медицинскому применению препарата ГЕПОН®, РУ Р N000015/01

Лечение ХЭ

Гормональная терапия

При атрофичном эндометрии –ЗГТ -**Дивигель по 1,0-4,0 гр геля** с 1 по 26 день менструального цикла и Праджисан по 200 мг 2 раза в день во влагалище с 17-26 день цикла 3-6 мес.

При кистозном эндометрии и простой гиперплазии эндометрия – КГК , гестагены - Праджисан)

При сложной гиперплазии без атипии – Бусерелин Лонг 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней № 4-6

Лечение АГЭ (аденоматоза с атипией)

- Бусерелин Лонг - в\м 1 раз в 28 дней № 6

Длительность лечения – 6 месяцев (через 2 и 6 месяцев - ГСС с отдельным выскабливанием цервикального канала и полости матки при АГЭ)

Прегравидарное консультирование необходимо проводить всем женщинам

При недостаточности лютеиновой фазы и идиопатическом невынашивании показана эмпирическая терапия препаратами прогестерона: Микронизированный прогестерон 200-300 мг интравагинально с 17-го по 26-й день цикла

Progestogen for preventing miscarriage in women with recurrent miscarriage of unclear etiology

Результаты обновленного обзора 13 клинических испытаний 2018 года с участием 556 женщин с повторными выкидышами в анамнезе:

*на ранних сроках беременности прием прогестогена женщинами с повторными выкидышами в анамнезе может сократить частоту выкидышей при текущей беременности с **26,3 до 19,4 %***

**Благодарю за
внимание**