


Патология кожи аногенитальной зоны у женщин

Доцент кафедры кожных и
венерических болезней Петрова
К.С.

Стрии



Полиморфный дерматит беременных



Хронический гидраденит



Камедоны



Микоз складок



Фолликулиты



Укус клеща



Мигрирующая эритема Афцелиуса- Липшютца



Энтеропатический акродерматит



Зуд анальной области



Розовый лишай



Контактный дерматит, опрелость



Опрелость



Контактный дерматит после использования слабительных



Для лечения дерматозов у детей с 4-х месяцев.

Деликатное действие^{1,2} + восстановление кожного барьера⁴

КОМФОДЕРМ® К

- › Уникальная запатентованная композиция с расширенными фармакологическими свойствами⁷: активный компонент – метилпреднизолон ацепонат⁵ + вспомогательный компонент – керамиды:⁶
- Керамидный комплекс представляет собой концентрированные и высокоочищенные гликокерамиды, аналогичные керамидам кожи человека, которых недостаточно при атопическом дерматите^{4,7}.
- Способствует восстановлению кожного барьера при дерматозах^{4,7}.
- › .
- › Удобство применения 1 раз в сутки¹.



¹Кореньков И.А., Еремеев С.А. Эффект применения глюкокортикостероидных препаратов для местного лечения атопического дерматита // Клиническая дерматология и венерология. – 2011. – №6. – С. 46-50.

² Zaunsl R.P., Rühmten H. et al. Methylprednisolone aceponate – an effective topical corticoid therapy with low side effects // Zeitschrift der Dermatologie. – 1992. – №5. – P. 247-253.

³ MS Health, данные цены, октябрь 2016 г.

⁴ Ceramide-dominant barrier repair lipids alleviate childhood atopic dermatitis: changes in barrier function provide a indicator of disease activity // J. Am Acad. dermatol. – 2002. – №47 (2). – P. 198-208. 5 Активный компонент в составе Комфодерм® К – метилпреднизолон ацепонат.

⁶ Вспомогательный компонент в составе Комфодерм® К – керамиды. 7. Патент заявка 201112052215.

Мазь для лечения хронических дерматозов у детей с 4-х месяцев

КОМФОДЕРМ®

МАЗЬ

› Уникальная запатентованная композиция с улучшенными фармакологическими свойствами:⁵

• Двойная эмоментная основа дополнительно смягчает кожу^{3,4,5,6,7}.

› .

› Удобство применения 1 раз в сутки¹.



1 Инструкция по применению Комфодерм® мазь.

2 MSN Health, цена на Комфодерм К, крем, 35, 30 с июля 2017.


3 Артемьев Е.Р., Остроцкий Е.В., Беляева С.М. Роль основы в глюкокортикостероидных препаратах: оптимальный состав и механизм действия // Вестник дерматологии. – 2010. – №2. – С. 64-69.

4 Roche cosmetics L. (int.). PCS Patents: Information Mixture (PIM) 471. PCS 5. Париж: 2013/2253915.

6 Двойная эмоментная основа – миста глицерина, вазелин.

7 Бауман Л. Комбинированная дерматология. Принципы и практика. – М: МЕДпрессинформ, 2012. – С. 534.

- Резкая отмена глюкокортикоидов может привести к обострению или быстрому возврату патологического процесса. Поэтому в современной дерматологии существует тенденция длительного применения корнеопротекторов после отмены кортикостероидного препарата, обозначаемая термином «корнеотерапия».



Склероатрофический лихен



Склероатрофический лихен



Склероатрофический лихен



Такропик, мазь 0,03% и 0,1%

- Отпускается по рецепту
- Включен в список ЖНВЛП
- **Первый дженерик Протопика****

Показание к применению:
лечение атопического дерматита

Рекомендован для предупреждения
обострений и увеличения длительности
ремиссии у пациентов с частыми
обострениями



МНН

Такролимус

Фармакологическая группа
*противовоспалительное
средство для местного
применения*

Форма выпуска

- Мазь для наружного
применения

Объем

15г

- Такролимус относится к группе ингибиторов кальциневрина. Он связывается со специфическим цитоплазматическим белком иммунофилином (FKBP12), который является цитозольным рецептором для кальциневрина (FK506).
- В результате этого формируется комплекс, включающий такролимус, FKBP12, кальций, кальмодулин и кальциневрин, что приводит к ингибированию фосфатазной активности кальциневрина.
- Это делает невозможным дефосфорилирование и транслокацию ядерного фактора активированных Т-клеток (NFAT), необходимого для инициации транскрипции генов, кодирующих продукцию ключевых для Т-клеточного иммунного ответа цитокинов (ИЛ-2 и интерферон-гамма).

- Кроме того, такролимус ингибирует транскрипцию генов, кодирующих продукцию таких цитокинов, как ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-5, гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (ГМКСФ) и фактор некроза опухоли (ФНО α), которые принимают участие в начальных этапах активации Т-лимфоцитов.
- Помимо этого, под влиянием такролимуса происходит ингибирование высвобождения медиаторов воспаления из тучных клеток, базофилов и эозинофилов, а также снижение экспрессии Fc ϵ RI (высокоаффинный поверхностный рецептор для иммуноглобулина E) на клетках Лангерганса, что ведет к снижению их активности и презентирования антигена Т-лимфоцитам.
- Мазь такролимуса не влияет на синтез коллагена и, таким образом, не вызывает атрофии кожи.



В соответствии с федеральными клиническими рекомендациями Российского Общества дерматовенерологов и косметологов мазь такролимус может применяться:

Такропик®

- Наружное лечение себорейного дерматита¹
- Наружная терапия розацеа²
- Наружная терапия витилиго³
- Наружная терапия атопического дерматита⁴



Показания к применению в соответствии с Инструкцией:
Атопический дерматит

1. Федеральные клинические рекомендации по ведению больных себорейным дерматитом. Российское общество дерматовенерологов и косметологов. 2015:10-11.
2. Федеральные клинические рекомендации по ведению больных розацеа. Российское общество дерматовенерологов и косметологов. 2015:14.
3. Федеральные клинические рекомендации по ведению больных витилиго. Российское общество дерматовенерологов и косметологов. 2015:10.
4. Федеральные клинические рекомендации по ведению больных атопическим дерматитом. Российское общество дерматовенерологов и косметологов. 2015:19-20.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Кафедра кожных и
венерических болезней
ПИМУ

Ул. Семашко д.22

Доцент кафедры к.м.н.

Петрова Ксения
Сергеевна

8-951-915-11-55

Телефон регистратуры
436-60-45

