Персонализированная онкология - от долгих разговоров, к делу. Как современная молекулярная диагностика меняет клиническую медицину и судьбы больных.

Жуков Николай Владимирович,
д.м.н., профессор, руководитель отдела
междисциплинарной онкологии ФГБУ НМИЦ ДГОИ им. Д.
Рогачева, доцент кафедры онкологии, гематологии и
лучевой терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова

18 мая 2021 г, Нижний Новгород

M-RU-00003170 Май 2021

Данная презентация подготовлена при финансовой поддержке АО "Рош-Москва", официального дистрибьютора "Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд." (Швейцария). Информация, размещенная в настоящем материале, содержит сведения о незарегистрированных в РФ лекарственных средствах/показаниях, носит исключительно научный характер и не является рекламой.

Как ни печально, но большую часть своей жизни мы заблуждались по поводу персонализированной терапии...

Сколько себя помню....

- ~~• Миру-мир...~~
- ~~• Экономика должна быть экономной...~~
- ~~• Хлеб всему голова...~~
- **Лечить нужно не болезнь, а больного...**
- **Каждый больной индивидуален...**

Традиции отечественной медицины

- Лечить не болезнь, а больного.
- Каждое лечение есть совершенно индивидуальный процесс.
- **Врач-художник** воспринимает каждого пациента как некий «уникум»

Эволюция персонализированной медицины с 1989 г. по 1995 и онкологии с 1995 по н.в.

Что застал лично...

Персонализированная медицина (1989-1995 г.г.)

Пришел ко мне больной,
который до это лечился у...
Но без эффекта
И вот тогда я, осмотрев
больного, окунул палец в
мочу и назначил ему ...,
после чего ему немедленно
полегчало!

Традиции отечественной медицины

- Лечить не болезнь, а больного.
- Каждое лечение есть совершенно индивидуальный процесс.
- **Врач-художник** воспринимает каждого пациента как некий «уникум»

Персонализированная онкология образца 1995 г. Что же назначить больному, профессор?

ИВАНОВУ 5-ФУ по 100
мг/м², болюсно с утра, № 5
ПЕТРОВУ 5-ФУ по 100
мг/м², болюсно, но
вечером и №4

- Набор доступных препаратов моей онкологической молодости...
 - 5-фторурацил
 - Доксорубицин
 - Эпирубицин
 - Дакарбазин
 - Ломустин
 - Цисплатин
 - Митомицин
 - Этопозид
 - Блеомицин
 - Винкристин
 - Метотрексат
 - Тамоксифен
 - Анастрозол

А почему Вы приняли такое решение?

Клиническое мышление и индивидуализация подходов, молодой человек!

- Перевод: у меня была пара (десяток, несколько десятков) больных, которые в схожей ситуации ответили на этот режим, при этом он относительно неплохо переносится...

Но вот прошла четверть века... Я сам уже профессор и сижу над клиническим случаем конкретного пациента

Мы столько уже знаем про молекулярный портрет заболеваний

У нас столько разных лечебных опций

Printed by Nikolay Zhukov on 7/23/2020 6:39:41 AM. For personal use only. Not approved for distribution. Copyright © 2020 National Comprehensive Cancer Network, Inc. All Rights Reserved.

PRINCIPLES OF ANCILLARY TECHNIQUES USEFUL IN THE DIAGNOSIS OF SARCOMAS

Morphologic diagnosis based on microscopic examination of histologic sections remains the gold standard for sarcoma diagnosis. However, several ancillary techniques are useful in support of morphologic diagnosis, including IHC, classical cytogenetics, electron microscopy, and molecular genetic testing. Molecular genetic testing has emerged as a particularly powerful ancillary testing approach since many sarcoma types harbor characteristic genetic aberrations, including single base pair substitutions, deletions and amplifications, and translocations. Most molecular testing utilizes fluorescence in situ hybridization (FISH) approaches or polymerase chain reaction (PCR)-based methods and next-generation sequencing (NGS)-based methods.¹ Recurrent genetic aberrations in sarcoma² are listed below:

TUMOR	ABERRATION	GENE(S) INVOLVED
Malignant Round Cell Tumors		
Alveolar RMS	t(2;13)(q35;q14) t(1;13)(p36;q14) t(2;13)(p13;q35) t(11;22)(p13;q12)	PAX3-FOXO1 PAX7-FOXO1 EWSR1-FLI1 Complex alterations
Desmoplastic small round cell tumor	t(11;22)(p13;q12)	Complex alterations
Embryonal RMS	Complex alterations	
Ewing sarcoma/peripheral neuroectodermal tumor	t(11;22)(q24;q12) t(21;22)(q22;q12) t(2;22)(q33;q12) t(7;22)(q22;q12) t(17;22)(q12;q12) inv(22)(q12q12) t(16;21)(p11;q22)	FUS-DDIT3 FUS-DDIT3 EWSR1-DDIT3 Unknown
Undifferentiated round cell sarcoma	t(4;19)(q35;q13) or t(10;11)(p11;p11.4p11.22)	

PRINCIPLES OF ANCILLARY TECHNIQUES USEFUL IN THE DIAGNOSIS OF SARCOMAS

TUMOR	ABERRATION	GENE(S) INVOLVED
Lipomatous Tumors		
Atypical lipomatous tumor/well-differentiated liposarcoma (ALT/WDL)	Supernumerary ring chromosomes; giant marker chromosomes	Amplification of region 12q14-15, including <i>MDM2</i> , <i>CDK4</i> , <i>HMG2A</i> , <i>SAS</i> , <i>GLI</i>
Dedifferentiated liposarcoma	Same as for ALT/WDL	Same as for ALT/WDL
Myxoid/round cell liposarcoma	t(12;16)(q13;p11) t(12;22)(q13;q12)	FUS-DDIT3 EWSR1-DDIT3
Pleomorphic liposarcoma	Complex alterations	Unknown
Other Sarcomas		
Alveolar soft part sarcoma	der(17)(X;17)(p11;q25)	ASPL-TFE3
Angiomatoid fibrous histiocytoma	t(12;22)(q13;q12) t(2;22)(q33;q12) t(12;16)(q13;p11)	EWSR1-ATF1 EWSR1-CREB1 FUS-ATF1
Clear cell sarcoma	t(12;22)(q13;q12) t(2;22)(q33;q12)	EWSR1-ATF1 EWSR1-ATF1
Congenital/infantile fibrosarcoma	t(1;1)(p11;p11)	
Dermatofibrosarcoma protuberans	t(17;22)(q11;q12)	
Desmoid fibromatosis	Tri	
High-grade endometrial stromal sarcoma	t(1;1)(p11;p11)	
Epithelioid hemangioendothelioma	t(1;1)(p11;p11)	

PRINCIPLES OF ANCILLARY TECHNIQUES USEFUL IN THE DIAGNOSIS OF SARCOMAS

TUMOR	ABERRATION	GENE(S) INVOLVED
Other Sarcomas - continued		
Epithelioid sarcoma	Inactivation, deletion, or mutation of <i>INI1</i> (<i>SMARCB1</i>)	<i>INI1</i> (<i>SMARCB1</i>)
Extrarenal rhabdoid tumor	Inactivation of <i>INI1</i> (<i>SMARCB1</i>)	<i>INI1</i> (<i>SMARCB1</i>)
Extraskeletal myxoid chondrosarcoma	t(9;22)(q22;q12) t(9;17)(p22;q11) t(9;19)(p22;q21) t(3;9)(p11;q22)	EWSR1-NR4A3 TAF11-NR4A3 TCF12-NR4A3 TFG-NR4A3
Sporadic and familial GIST Carney-Stratakis syndrome (gastric GIST and paraganglioma)	Activating kinase mutations Krebs cycle mutation	<i>KIT</i> or <i>PDGFR</i> Germline <i>SDH</i> subunit mutations
Inflammatory myofibroblastic tumor (IMT)	t(1;2)(q22;p23) t(2;19)(p23;p13) t(2;17)(p23;q23) t(2;2)(p23;q13) t(2;11)(p23;p15) inv(3)(p23-q39)	TPM3-ALK ⁵ TPM4-ALK ⁶ CLTC-ALK ⁶ RANBP2-ALK ⁶ CAR3-ALK ⁶ ATC-ALK ⁶
Leiomyosarcoma	Complex alterations	Unknown
Low-grade fibromyxoid sarcoma	t(7;16)(q33;p11) t(11;16)(p11;p11)	FUS-CREB3L2 FUS-CREB3L1
Malignant peripheral nerve sheath tumor		<i>NF1</i> , <i>CDKN2A</i> and <i>EED</i> or <i>SUZ12</i>
Mesenchymal chondrosarcoma	t(8;8)(q13;q21)	<i>HEY1</i> - <i>NCOA2</i>
Solitary fibrous tumor	inv(12)(q13q13)	<i>NAB2</i> - <i>STAT6</i>
Synovial sarcoma	t(X;18)(p11;q11) t(X;18)(p11;q11) t(X;18)(p11;q11)	SS18-SSX1 SS18-SSX2 SS18-SSX4
Tenosynovial giant cell tumor/pigmented villonodular synovitis (TGCT/PVNS)	t(1;2)(p13;q35)	<i>CSF1</i>

Printed by Nikolay Zhukov on 7/23/2020 6:39:41 AM. For personal use only. Not approved for distribution. Copyright © 2020 National Comprehensive Cancer Network, Inc. All Rights Reserved.

SYSTEMIC THERAPY AGENTS AND REGIMENS WITH ACTIVITY IN SOFT TISSUE SARCOMA SUBTYPES^{a,b,c}

Soft Tissue Sarcoma Subtypes with Non-Specific Histologies

(Regimens Appropriate for General STS;^{d,e} see other sections for histology-specific recommendations)

	Preferred Regimens	Other Recommended Regimens	Useful in Certain Circumstances
Neoadjuvant/Adjuvant Therapy	<ul style="list-style-type: none"> • AIM (doxorubicin, ifosfamide, mesna)¹⁻⁴ • Ifosfamide, epirubicin, mesna⁵ 	<ul style="list-style-type: none"> • AD (doxorubicin, dacarbazine)^{1,2,6,7} - if ifosfamide is not considered appropriate • Doxorubicin^{1,2,8} • Gemcitabine and docetaxel^{9,10} 	<ul style="list-style-type: none"> • Ifosfamide^{5,8,9-13}
First-Line Therapy Advanced/Metastatic	<ul style="list-style-type: none"> • Anthracycline-based regimens: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Doxorubicin^{1,2,8} ▶ Epirubicin¹⁴ ▶ Liposomal doxorubicin¹⁵ • AD (doxorubicin, dacarbazine)^{1,2,6,7} • AIM (doxorubicin, ifosfamide, mesna)¹⁻⁴ • MAID (mesna, doxorubicin, ifosfamide, dacarbazine)^{1,2,16,17} ▶ Ifosfamide, epirubicin, mesna⁵ 	<ul style="list-style-type: none"> • Gemcitabine-based regimens: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gemcitabine ▶ Gemcitabine and docetaxel^{9,10} ▶ Gemcitabine and vinorelbine¹¹ ▶ Gemcitabine and dacarbazine¹² 	<ul style="list-style-type: none"> • Pazopanib¹⁸ (patients ineligible for IV chemotherapy) • Larotrectinib^{1,19} (for <i>NTRK</i> gene-fusion sarcomas) • Entrectinib^{k,20} (for <i>NTRK</i> gene-fusion sarcomas)
Subsequent Lines of Therapy for Advanced/Metastatic Disease	<ul style="list-style-type: none"> • Eribulin^{f,g,21} (category 1 recommendation for liposarcoma, category 2A for other subtypes) • Pazopanib^{f,18} (for non-adipocytic sarcoma) • Trabectedin^{f,h,22-24} (category 1 recommendation for liposarcoma and leiomyosarcoma) 	<ul style="list-style-type: none"> • Dacarbazine • Ifosfamide^{5,8,9-13} • Temozolomide^{f,25} • Vinorelbine^{f,26} • Regorafenib^{i,27} 	

Персонализированная медицина образца 2021 г.
Что же назначить больному, Николай Владимирович?

Думаю, что в этом случае
надо дать винорельбин

А почему?

Клиническое мышление,
результаты исследований,
клинические рекомендации
и индивидуализация
подходов, молодой
человек!

- Перевод: у меня была пара (десяток, несколько десятков) больных, которые в схожей ситуации ответили на этот режим очень неплохой ремиссией, при этом он относительно неплохо переносится...

В «женских» опухолях до
недавнего времени было еще
«круче»...

Рак яичников... Вы можете выбрать любой режим, при условии, что это будет платина с таксанами. Потом можете делать, что хотите...

2006

2010

2017

NCCN[®] Practice Guidelines in Oncology – v.1.2006 Epithelial Ovarian Cancer

[Guidelines Index](#) [Ovarian Cancer TOC](#) [Staging, MS, References](#)

PATHOLOGIC STAGING **PRIMARY CHEMOTHERAPY/PRIMARY ADJUVANT[†]**

Stage IA or IB
 Grade 1^d → Observe
 Grade 2^d → Observe or Taxane/carboplatin[†] for 3-6 cycles
 Grade 3 → Taxane/carboplatin[†] for 3-6 cycles
 → [See Monitoring/Follow-Up \(OV-5\)](#)

Stage IC
 Grade 1, 2, or 3 → Taxane/carboplatin[†] for 3-6 cycles

Stage II
 Stage III
 Stage IV → Taxane/carboplatin for 6 cycles
 Interval debulking as indicated by tumor response and potential resectability in selected patients
 or
 IP chemotherapy may be considered in low-volume optimally debulked Stage III patients (category 2B)
 or
 Whole abdominal RT for microscopic disease for selected patients (category 3) with Stage III disease
 → [See Secondary Adjuvant \(OV-4\)](#)

^dClear-cell pathology is Grade 3.
[†]Patients receiving primary chemotherapy will be monitored as follows:
 1. Pelvic exams at least every 2 cycles
 2. Interim CBC with platelets as indicated
 3. Chemistry profiles if indicated
 4. CA-125 levels prior to each cycle of chemotherapy, if informative
 5. Radiographic imaging if indicated

[‡]Preferred regimen:
 1. Paclitaxel 175 mg/m² over 3 hours and carboplatin AUC 5.0-7.5 every 3 weeks
 Alternative regimens (category 2B):
 1. Docetaxel 60-75 mg/m² over 1 hour and carboplatin AUC 5-6 every 3 weeks
 2. Paclitaxel 135 mg/m² IV 24 h infusion day 1; cisplatin 100 mg/m² IP, day 2 after IV paclitaxel; paclitaxel 60 mg/m² IP, day 8 (max BSA 2.0 m²). Repeat every 3 weeks x 6 courses.

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.
 Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any cancer patient is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

[Go Back To Ovarian Cancer Table of Contents](#)

Version 1.2006, 01/03/06 © 2006 National Comprehensive Cancer Network, Inc. All rights reserved. These guidelines and this illustration may not be reproduced in any form without the express written permission of NCCN. **OV-3**

NCCN[®] Practice Guidelines in Oncology – v.2.2010 Epithelial Ovarian Cancer/ Fallopian Tube Cancer/ Primary Peritoneal Cancer

[Guidelines Index](#) [Ovarian Cancer TOC](#) [Staging, Discussion, References](#)

PATHOLOGIC STAGING **PRIMARY CHEMOTHERAPY/PRIMARY ADJUVANT[†]**

Stage IA or IB
 Grade 1^d → Observe
 Grade 2^d → Observe or Intravenous (IV) Taxane/carboplatin[†] for 3-6 cycles
 Grade 3 → IV Taxane/carboplatin[†] for 3-6 cycles
 → [See Monitoring/Follow-Up \(OV-5\)](#)

Stage IC
 Grade 1, 2, or 3 → IV Taxane/carboplatin[†] for 3-6 cycles

Stage II
 Stage III
 Stage IV → Intraperitoneal (IP) chemotherapy^{d,f,i} in <1 cm optimally debulked Stage II patients and Stage III patients (category 1 for Stage III)
 or
 Intravenous Taxane/carboplatin[†] for a total of 6-8 cycles (category 1)
 Completion surgery as indicated by tumor response and potential resectability in selected patients^g
 → [See Secondary Adjuvant \(OV-4\)](#)

^dAll women undergoing surgery for ovarian cancer should be counseled about the clinical benefit associated with combined IV and IP chemotherapy administration prior to surgery.
<http://www.cancer.gov/clinicaltrials/developments/Ipchemo-digest/page1/print>
^eSee Principles of Primary Surgery (OV-A).
^fSee Principles of Chemotherapy (OV-B) and Management of Drug Reactions (OV-C).
^gClear-cell pathology is Grade 3.
[†]Patients receiving primary chemotherapy will be monitored as follows:
 1. Pelvic exams at least every 2 cycles
 2. Interim CBC with platelets as indicated
 3. Chemistry profiles if indicated
 4. CA-125 levels or other tumor markers as clinically indicated prior to each cycle of chemotherapy
 5. Radiographic imaging if indicated

[‡]Regimens:
 1. Paclitaxel 135 mg/m² IV continuous infusion over 24 h Day 1; cisplatin 75-100 mg/m² IP, Day 2 after IV paclitaxel; paclitaxel 60 mg/m² IP Day 8 (max BSA 2.0 m²). Repeat every 3 weeks x 6 cycles (category 1).
 2. Paclitaxel 175 mg/m² IV over 3 hours followed by carboplatin AUC 5-7.5 IV over 1 hour Day 1 Repeat every 3 weeks x 6 cycles (category 1).
 3. Docetaxel 60-75 mg/m² IV over 1 hour followed by carboplatin AUC 5-6 IV over 1 hour Day 1. Repeat every 3 weeks x 6 cycles (category 1).
 4. Dose-dense paclitaxel 60 mg/m² IV over 1 hour Days 1, 8, and 15 and carboplatin AUC 6 IV over 1 hour Day 1. Repeat every 3 weeks x 6 cycles (category 1)

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.
 Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any cancer patient is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

Version 2.2010, 02/24/10 © 2010 National Comprehensive Cancer Network, Inc. All rights reserved. These guidelines and this illustration may not be reproduced in any form without the express written permission of NCCN. **OV-3**

NCCN[®] National Comprehensive Cancer Network[®] NCCN Guidelines Version 5.2017 Epithelial Ovarian Cancer/Fallopian Tube Cancer/ Primary Peritoneal Cancer

[NCCN Guidelines Index](#) [Ovarian Cancer TOC](#) [Discussion](#)

PATHOLOGIC STAGING^{d,e} **PRIMARY CHEMOTHERAPY/PRIMARY ADJUVANT THERAPY[†]**

Less common ovarian histology (LCOH) (ie, carcinosarcoma, clear cell, mucinous, low-grade [grade 1] serous, borderline epithelial, malignant sex cord-stromal/germ cell tumors)^g → [See LCOH-1](#)

Stage IA or IB
 Grade 1^{†m} (low-grade) serous/endometrioid → [See LCOH-5](#)
 Grade 2^{†m} serous/endometrioid → Observe or Intravenous (IV) taxane/carboplatin[†] x 3-6 cycles^{†,h}
 Grade 3^{†m} (high-grade) → IV taxane/carboplatin[†] x 3-6 cycles^{†,h}

Stage IC (Grade 1, 2, or 3) → **Chemotherapy (See Primary Regimens (OV-B, 3 of 8))[†]**
 • Intraperitoneal (IP) chemotherapy^{d,i} in <1 cm optimally debulked stage II and stage III patients (category 1 for stage III, category 2A for stage II and LCOH)
 or
 • IV taxane/carboplatin[†] for a total of 6 cycles (category 1, category 2A for LCOH)
 • Completion surgery as indicated by tumor response and potential resectability in selected patients^g

Stage II
 Stage III
 Stage IV → **Chemotherapy (See Primary Regimens (OV-B, 3 of 8))[†]**
 • Intraperitoneal (IP) chemotherapy^{d,i} in <1 cm optimally debulked stage II and stage III patients (category 1 for stage III, category 2A for stage II and LCOH)
 or
 • IV taxane/carboplatin[†] for a total of 6 cycles (category 1, category 2A for LCOH)
 • Completion surgery as indicated by tumor response and potential resectability in selected patients^g

Consider symptom management and best supportive care. Refer for palliative care assessment, if appropriate.
 • See NCCN Guidelines for Palliative Care
 • See NCCN Guidelines for Survivorship

Consider symptom management and best supportive care. Refer for palliative care assessment, if appropriate.
 • See NCCN Guidelines for Palliative Care
 • See NCCN Guidelines for Survivorship

^dAll women undergoing surgery for ovarian cancer should be counseled about the clinical benefit associated with combined IV and IP chemotherapy administration prior to surgery. [See Principles of Primary Surgery \(OV-A\)](#).
^eSee Principles of Chemotherapy (OV-B) and Management of Drug Reactions (OV-C).
[†]Patients receiving primary chemotherapy will be monitored as follows:
 1. Every 2-3 cycles. Physical exam and consider pelvic exam
 2. Interim CBC with platelets as indicated
 3. Chemistry profiles if indicated
 4. CA-125 levels or other tumor markers as clinically indicated prior to each cycle of chemotherapy
 5. Chest/abdominal/pelvic CT or MRI with contrast, PET/CT (skull base to mid-thigh), or PET as indicated
^gData suggest select patients with serous histology may benefit from 6 cycles. [See Discussion](#).

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.
 Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any patient with cancer is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

Version 5.2017, 02/02/17 © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2017. All rights reserved. The NCCN Guidelines® and this illustration may not be reproduced in any form without the express written permission of NCCN. **OV-3**

Ура! Теперь платину с таксанами можно вводить интраперитонеально, а при рецидивах использовать бевацизумаб!

Шейка матки... Вы можете выбрать любой режим, при условии, что это будет платина с таксанами. Потом можете делать, что хотите...

2006

2010

2017

CHEMOTHERAPY REGIMENS FOR RECURRENT OR METASTATIC CERVICAL CANCER		
First-line therapy	Possible first-line combination therapy¹	Second-line therapy
<ul style="list-style-type: none"> • Cisplatin • Carboplatin • Paclitaxel • Topotecan 	<ul style="list-style-type: none"> • Cisplatin/paclitaxel (category 1) • Cisplatin/topotecan (category 1) • Cisplatin/gemcitabine • Carboplatin/paclitaxel 	<ul style="list-style-type: none"> • Docetaxel • Ifosfamide • Vinorelbine • Irinotecan • Epirubicin • Mitomycin • 5-FU

[Back to Cervical Cancer](#)
[Table of Contents](#)

¹Preferred if cisplatin was previously used as a radiosensitizer.

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.
Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any cancer patient is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

CHEMOTHERAPY REGIMENS FOR RECURRENT OR METASTATIC CERVICAL CANCER (Strongly consider clinical trial)		
First-line combination therapy	Possible first-line single agent therapy (Strongly consider clinical trial)	Second-line therapy (All agents listed are category 2B)
<ul style="list-style-type: none"> • Cisplatin/paclitaxel (category 1)¹ • Carboplatin/paclitaxel • Cisplatin/topotecan • Cisplatin/gemcitabine (category 2B) 	<ul style="list-style-type: none"> • Cisplatin (preferred as a single agent) • Carboplatin • Paclitaxel 	<ul style="list-style-type: none"> • Bevacizumab • Docetaxel • Epirubicin • 5-FU (5-fluorouracil) • Gemcitabine • Ifosfamide • Irinotecan • Liposomal doxorubicin • Mitomycin • Pemetrexed • Topotecan • Vinorelbine

¹Monk BJ, Sill MW, McMeekin DS, et al. Phase III trial of four cisplatin-containing doublet combinations in stage IVB, recurrent, or persistent cervical carcinoma: A Gynecologic Oncology Group Study. J Clin Oncol 2009 0; JCO 2009.21.8909.

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.
Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any cancer patient is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

CHEMOTHERAPY REGIMENS FOR RECURRENT OR METASTATIC CERVICAL CANCER ¹ (Strongly consider clinical trial)		
First-line combination therapy^{1†}	Possible first-line single-agent therapy	Second-line therapy^{1††} (Agents listed are category 2B unless otherwise noted)
<ul style="list-style-type: none"> • Cisplatin/paclitaxel/bevacizumab¹ (category 1) • Cisplatin/paclitaxel (category 1)^{2,3} • Topotecan/paclitaxel/bevacizumab¹ (category 1) • Carboplatin/paclitaxel^{4,5} (Category 1 for patients who have received prior cisplatin therapy) • Carboplatin/paclitaxel/bevacizumab • Cisplatin/topotecan⁶ • Topotecan/paclitaxel • Cisplatin/gemcitabine (category 3)⁷ 	<ul style="list-style-type: none"> • Cisplatin (preferred as a single agent)³ • Carboplatin⁵ • Paclitaxel⁹ 	<ul style="list-style-type: none"> • Bevacizumab • Albumin-bound paclitaxel • Docetaxel • 5-FU (5-fluorouracil) • Gemcitabine • Ifosfamide • Irinotecan • Mitomycin • Pemetrexed • Topotecan • Vinorelbine

¹Cisplatin, carboplatin, docetaxel, and paclitaxel may cause drug reactions (See NCCN Guidelines for Ovarian Cancer—Management of Drug Reactions [OY.C]).

^{††}Cost and toxicity should be carefully considered when selecting an appropriate regimen for treatment.

^{†††}References for second-line therapy are provided in the [Discussion](#).

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.
Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any patient with cancer is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

Ура! Можете еще добавить бевацизумаб!

Рак тела матки... Вы можете выбрать... Выбрать, что ХОТИТЕ...

2006

THERAPY FOR RECURRENT OR METASTATIC DISEASE

HORMONAL THERAPY

- Progestational agents
- Tamoxifen
- Aromatase inhibitors

CHEMOTHERAPY REGIMENS

- Cisplatin
- Carboplatin
- Paclitaxel
- Doxorubicin
- Cisplatin/doxorubicin/paclitaxel
- Cisplatin/doxorubicin
- Carboplatin/paclitaxel
- Strongly encourage clinical trials

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.
Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any cancer patient is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

[Back to Salvage Therapy \(ENDO-9\)](#)

2010

SYSTEMIC THERAPY FOR RECURRENT, METASTATIC OR HIGH-RISK DISEASE (STRONGLY ENCOURAGE PARTICIPATION IN CLINICAL TRIALS)

HORMONAL THERAPY¹

- Aromatase inhibitors
- Progestational agents
- Tamoxifen

CHEMOTHERAPY REGIMENS²

(Multi-agent chemotherapy regimens preferred, if tolerated)

- Cisplatin/doxorubicin (category 1)
- Cisplatin/doxorubicin/paclitaxel (category 1)
- Ifosfamide plus paclitaxel (category 1 for carcinosarcoma)
- Carboplatin/paclitaxel
- Cisplatin
- Carboplatin
- Doxorubicin
- Paclitaxel
- Cisplatin/ifosfamide (for carcinosarcoma)
- Ifosfamide (for carcinosarcoma)
- Irabepilone may be used as a single agent for second line treatment of patients (category 2B)

¹Hormonal therapy is for endometrioid histologies only (ie, not for papillary serous carcinoma, clear cell carcinoma, or carcinosarcoma).
²Chemotherapy regimens are for endometrioid histologies, papillary serous carcinoma, or clear cell carcinoma. A few of the agents can also be used for carcinosarcoma, as indicated.

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.
Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any cancer patient is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

2017

SYSTEMIC THERAPY FOR RECURRENT, METASTATIC, OR HIGH-RISK DISEASE (STRONGLY ENCOURAGE PARTICIPATION IN CLINICAL TRIALS)

CHEMOTHERAPY REGIMENS^{2,3}

• Multi-agent chemotherapy regimens preferred, if tolerated

- Carboplatin/paclitaxel⁴
- Cisplatin/doxorubicin⁵
- Cisplatin/doxorubicin/paclitaxel^{5,6}
- Carboplatin/docetaxel⁷
- Ifosfamide/paclitaxel (category 1 for carcinosarcoma)⁸
- Cisplatin/ifosfamide (for carcinosarcoma)

• Single agents

- Cisplatin
- Carboplatin
- Doxorubicin
- Liposomal doxorubicin
- Paclitaxel
- Topotecan
- Bevacizumab⁹
- Temsirolimus¹⁰
- Docetaxel⁷ (category 2B)
- Ifosfamide (for carcinosarcoma)

HORMONAL THERAPY¹

- Megestrol/tamoxifen (alternating)
- Progestational agents
- Aromatase inhibitors
- Tamoxifen

¹Hormonal therapy may be used for lower grade endometrioid histologies only (ie, not for G3 endometrioid, serous carcinoma, clear cell carcinoma, or carcinosarcoma) preferably in patients with small tumor volume or an indolent growth pace.

²Cisplatin, carboplatin, liposomal doxorubicin, paclitaxel, and docetaxel may cause drug reactions.

(See [NCCN Guidelines for Ovarian Cancer—Management of Drug Reactions \(OV-C\)](#))

³Chemotherapy regimens can be used for all carcinoma histologies. Carcinosarcomas are now considered and treated as high-grade carcinomas. However, ifosfamide-based regimens were previously used for carcinosarcomas.

⁴Miller D, Filiaeo V, Fleming G, et al. Randomized phase III noninferiority trial of first line chemotherapy for metastatic or recurrent endometrial carcinoma: a Gynecologic Oncology Group study [abstract]. Gynecol Oncol 2012;125:771.

⁵Homesley HD, Filiaeo V, Gibbons SK, et al. A randomized phase III trial in advanced endometrial carcinoma of surgery and volume directed radiation followed by cisplatin and doxorubicin with or without paclitaxel: A Gynecologic Oncology Group study. Gynecol Oncol 2009;112:543-552.

⁶The cisplatin/doxorubicin/paclitaxel regimen is not widely used because of concerns about toxicity.

⁷Docetaxel may be considered for patients in whom paclitaxel is contraindicated.

⁸Homesley HD, Filiaeo V, Markman M, et al. Phase III trial of ifosfamide with or without paclitaxel in advanced uterine carcinosarcoma: a Gynecologic Oncology Group Study. J Clin Oncol 2007;25:528-531.

⁹Bevacizumab may be considered for use in patients who have progressed on prior cytotoxic chemotherapy. (Aghajanian C, Sill MW, Darcy KM, et al. Phase II trial of bevacizumab in recurrent or persistent endometrial cancer: a Gynecologic Oncology Group study. J Clin Oncol 2011;29:2259-2265.)

¹⁰Oza AM, Eli L, Tsao MS, et al. Phase II study of temsirolimus in women with recurrent or metastatic endometrial cancer: a trial of the NCCN Clinical Trials Group. J Clin Oncol 2011;29:3278-3285.

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.
Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any patient with cancer is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

При условии, что это будет платина с таксанами...

И только РМЖ «выбивался» аж целыми двумя предсказательными маркерами, определяющими первоначальную тактику лечения

NCCN® Practice Guidelines in Oncology – V.2.2010 Invasive Breast Cancer [Guidelines Index](#) [Breast Cancer TOC](#) [Staging, Discussion, References](#)

HISTOLOGY	HORMONE RECEPTOR STATUS	HER2 STATUS	SYSTEMIC ADJUVANT TREATMENT
<ul style="list-style-type: none"> • Ductal^o • Lobular • Mixed • Metaplastic 	ER-positive and/or PR positive	HER2 positive ^b	See Systemic Adjuvant Treatment - Hormone Receptor Positive - HER2 Positive Disease (BINV-5)
		HER2 negative ^b	See Systemic Adjuvant Treatment - Hormone Receptor Positive - HER2 Negative Disease (BINV-6)
	ER-negative and PR-negative	HER2 positive ^b	See Systemic Adjuvant Treatment - Hormone Receptor Negative - HER2 Positive Disease (BINV-7)
		HER2 negative ^b	See Systemic Adjuvant Treatment - Hormone Receptor Negative - HER2 Negative Disease (BINV-8)
<ul style="list-style-type: none"> • Tubular • Colloid 	ER-positive and/or PR positive		See Systemic Adjuvant Treatment - Favorable Histologies (BINV-9)
	ER-negative and PR-negative		

^bSee Principles of HER2 Testing (BINV-A).
^oThis includes medullary and micropapillary subtypes.

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.
 Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any cancer patient is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

Version 2.2010 03/16/2010 © 2010 National Comprehensive Cancer Network, Inc. All rights reserved. These guidelines and this illustration may not be reproduced in any form without the express written permission of NCCN. **BINV-4**

NCCN® Practice Guidelines in Oncology – V.2.2010 Invasive Breast Cancer [Guidelines Index](#) [Breast Cancer TOC](#) [Staging, Discussion, References](#)

SYSTEMIC TREATMENT OF RECURRENT OR STAGE IV DISEASE

Local recurrence

- Initial treatment with lumpectomy + radiation therapy → Total mastectomy + axillary lymph node staging if level I/II axillary dissection not previously done^{ff}
- Initial treatment with mastectomy + level I/II axillary dissection and prior radiation therapy → Surgical resection if possible^{gg}
- Initial treatment with mastectomy no prior radiation therapy → Surgical resection if possible + radiation therapy to chest wall and supraclavicular nodes

Systemic disease^{dd,ee}

- Bone disease present → Add bisphosphonate^{dd}
 - ER and/or PR positive; HER2 negative^b → [See BINV-17](#)
 - ER and/or PR positive; HER2 positive^b → [See BINV-18](#)
- Bone disease not present
 - ER and PR negative, or ER and/or PR positive and endocrine refractory; HER2 negative^b → [See BINV-18](#)
 - ER/PR negative; HER2 positive^b → [See BINV-19](#)

^bSee Principles of HER2 Testing (BINV-A).
^{dd}Pamidronate or zoledronic acid (with calcium 1200-1500 mg and vitamin D 400-800 IU daily supplement) should be given (category 1) in addition to chemotherapy or endocrine therapy if bone metastasis present, expected survival ≥ 3 months, and creatinine < 3.0 mg/dL. Patients should undergo a dental examination with preventive dentistry prior to initiation of bisphosphonate therapy.
^{ee}See NCCN Palliative Care Guidelines.
^{ff}In women with a local breast recurrence after breast conserving surgery who had a prior sentinel lymph node biopsy, a repeat SNB may be technically possible. The accuracy of repeat SNB is unproven, and the prognostic significance of repeat SNB after mastectomy is unknown and its use discouraged.
^{gg}If not technically resectable, consider systemic therapy to best response, then resect if possible.

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.
 Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any cancer patient is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

Version 2.2010 03/16/2010 © 2010 National Comprehensive Cancer Network, Inc. All rights reserved. These guidelines and this illustration may not be reproduced in any form without the express written permission of NCCN. **BINV-16**

Но и в РМЖ после определения с классами препаратов, которые можно использовать, – ВНОВЬ «лечите, чем ХОТИТЕ»

NCCN[®] Practice Guidelines in Oncology – V.2.2010 **Invasive Breast Cancer** [Guidelines Index](#) [Breast Cancer TOC](#) [Staging, Discussion, References](#)

PREFERRED CHEMOTHERAPY REGIMENS FOR RECURRENT OR METASTATIC BREAST CANCER¹

<u>PREFERRED SINGLE AGENTS</u> <i>Anthracyclines</i> <ul style="list-style-type: none">• Doxorubicin• Epirubicin• Pegylated liposomal doxorubicin <i>Taxanes</i> <ul style="list-style-type: none">• Paclitaxel• Docetaxel• Albumin-bound paclitaxel <i>Anti-metabolites</i> <ul style="list-style-type: none">• Capecitabine• Gemcitabine <i>Other microtubule inhibitors</i> <ul style="list-style-type: none">• Vinorelbine <u>OTHER SINGLE AGENTS</u> <ul style="list-style-type: none">• Cyclophosphamide• Mitoxantrone• Cisplatin• Etoposide (po) (category 2B)• Vinblastine• Fluorouracil CI• Ixabepilone <u>PREFERRED AGENTS WITH BEVACIZUMAB</u> <ul style="list-style-type: none">• Paclitaxel²	<u>PREFERRED CHEMOTHERAPY COMBINATIONS</u> <ul style="list-style-type: none">• CAF/FAC (cyclophosphamide/doxorubicin/fluorouracil)• FEC (fluorouracil/epirubicin/cyclophosphamide)• AC (doxorubicin/cyclophosphamide)• EC (epirubicin/cyclophosphamide)• AT (doxorubicin/docetaxel; doxorubicin/paclitaxel)• CMF (cyclophosphamide/methotrexate/fluorouracil)• Docetaxel/capecitabine• GT (gemcitabine/paclitaxel) <u>OTHER COMBINATIONS</u> <ul style="list-style-type: none">• Ixabepilone + capecitabine (category 2B) <u>PREFERRED FIRST-LINE AGENTS FOR HER2-POSITIVE DISEASE</u> <i>Trastuzumab with:</i> <ul style="list-style-type: none">• Paclitaxel ± carboplatin• Docetaxel• Vinorelbine• Capecitabine <u>PREFERRED AGENTS FOR TRASTUZUMAB-EXPOSED HER2-POSITIVE DISEASE</u> <ul style="list-style-type: none">• Lapatinib + capecitabine• Trastuzumab + other first-line agents• Trastuzumab + capecitabine• Trastuzumab + lapatinib (without cytotoxic therapy)
---	--

¹There is no compelling evidence that combination regimens are superior to sequential single agents.
²A single randomized clinical trial documents superior time to progression with the combination of bevacizumab plus paclitaxel compared with paclitaxel alone for first line chemotherapy of metastatic disease.

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.
Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any cancer patient is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

Version 2.2010 03/16/2010 © 2010 National Comprehensive Cancer Network, Inc. All rights reserved. These guidelines and this illustration may not be reproduced in any form without the express written permission of NCCN. **BINV-M**
1 of 6

Был ли у нас выбор, что назначить? О, да! Огромный и давно! Лечите – чем хотите!

Printed by Nisha Zholov on 7/28/2010 10:15:40 AM. For personal use only. Not approved for distribution. Copyright © 2010 National Comprehensive Cancer Network, Inc. All Rights Reserved.

ACCEPTABLE RECURRENCE THERAPIES¹

Agents	Cytotoxic Therapy	Hormonal Therapy	Targeted Therapy	Radiation Therapy
Preferred Agents	<ul style="list-style-type: none"> Combination if platinum sensitive Carboplatin/paclitaxel (category 1)² Carboplatin/weekly paclitaxel² Carboplatin/docetaxel² Carboplatin/gemcitabine² Carboplatin/ipsosomal doxorubicin² Cisplatin/gemcitabine² 		Bevacizumab	
	<ul style="list-style-type: none"> Single-agent if platinum sensitive Carboplatin Cisplatin 			
	<ul style="list-style-type: none"> Single-agent non-platinum based if platinum resistant Docetaxel Etoposide, oral Gemcitabine Liposomal doxorubicin Paclitaxel, weekly Pemetrexed Topotecan 			
Other Potentially Active Agents	<ul style="list-style-type: none"> Allretamine Capecitabine Cyclophosphamide Ifosfamide Irinotecan Melphalan Oxaliplatin Paclitaxel Vinorelbine 	<ul style="list-style-type: none"> Anastr Letroz Leuprc Mege Tamox 		

SYSTEMIC THERAPY FOR RECURRENT, METASTATIC OR HIGH-RISK D (STRONGLY ENCOURAGE PARTICIPATION IN CLINICAL TRIALS)

HORMONAL THERAPY¹

- Aromatase inhibitors
 - Progestational agents
 - Tamoxifen
- ### CHEMOTHERAPY REGIMENS²
- (Multi-agent chemotherapy regimens preferred, if tolerated)
- Cisplatin/doxorubicin (category 1)
 - Cisplatin/doxorubicin/paclitaxel (category 1)
 - Ifosfamide plus paclitaxel (category 1 for carcinosarcoma)
 - Carboplatin/paclitaxel
 - Cisplatin
 - Carboplatin
 - Doxorubicin
 - Paclitaxel
 - Cisplatin/ifosfamide (for carcinosarcoma)
 - Ifosfamide (for carcinosarcoma)
 - Ixabepilone may be used as a single agent for second line treatment of patients (category 2B)

¹Patients who progress on two consecutive therapy regimens without evidence of clinical therapy. Decisions to offer clinical trials, supportive care, or additional therapy should be based on clinical trial results.
²Platinum-based combination therapy should be considered for platinum-sensitive recurrent disease.

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.
Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any cancer patient is in a clinical trial. P

Version 2.2010: 02/24/10 © 2010 National Comprehensive Cancer Network, Inc. All rights reserved. These guidelines and this illustration are copyrighted material owned by NCCN. All rights reserved. This illustration may not be reproduced in any form without the express written permission of NCCN.

CHEMOTHERAPY REGIMENS FOR RECURRENT OR METASTATIC CERVICAL CANCER (Strongly consider clinical trial)

First-line combination therapy

- Cisplatin/paclitaxel (category 1)¹
- Carboplatin/paclitaxel
- Cisplatin/topotecan
- Cisplatin/gemcitabine (category 2B)

Possible first-line single agent therapy

- Cisplatin (preferred as a single agent)
- Carboplatin
- Paclitaxel

Second-line therapy

- (All agents listed are category 2B)
- Bevacizumab
 - Docetaxel
 - Epirubicin
 - 5-FU (5-fluorouracil)
 - Gemcitabine
 - Ifosfamide
 - Irinotecan
 - Liposomal doxorubicin
 - Mitomycin
 - Pemetrexed
 - Topotecan
 - Vinorelbine

¹Monk BJ, Sill MW, McMeekin DS, et al. Phase III trial of four cisplatin-containing doublet combinations in stage IVB, recurrent, or persistent cervical carcinoma: A Gynecologic Oncology Group Study. J Clin Oncol 2009 0. JCO.2009.21.8909.

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.

Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any cancer patient is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

Version 1.2010: 10/20/09 © 2009 National Comprehensive Cancer Network, Inc. All rights reserved. These guidelines and this illustration may not be reproduced in any form without the express written permission of NCCN.

ENDO-B

PREFERRED CHEMOTHERAPY REGIMENS FOR RECURRENT OR METASTATIC BREAST CANCER¹

PREFERRED SINGLE AGENTS

- Anthracyclines**
- Doxorubicin
 - Epirubicin
 - Pegylated liposomal doxorubicin
- Taxanes**
- Paclitaxel
 - Docetaxel
 - Albumin-bound paclitaxel
- Anti-metabolites**
- Capecitabine
 - Gemcitabine
- Other microtubule inhibitors**
- Vinorelbine

OTHER SINGLE AGENTS

- Cyclophosphamide
- Mitoxantrone
- Cisplatin
- Etoposide (po) (category 2B)
- Vinblastine
- Fluorouracil CI
- Ixabepilone

PREFERRED AGENTS WITH BEVACIZUMAB

- Paclitaxel²

PREFERRED CHEMOTHERAPY COMBINATIONS

- CAF/FAC (cyclophosphamide/doxorubicin/fluorouracil)
- FEC (fluorouracil/epirubicin/cyclophosphamide)
- AC (doxorubicin/cyclophosphamide)
- EC (epirubicin/cyclophosphamide)
- AT (doxorubicin/docetaxel); doxorubicin/paclitaxel
- CMF (cyclophosphamide/methotrexate/fluorouracil)
- Docetaxel/capecitabine
- GT (gemcitabine/paclitaxel)

OTHER COMBINATIONS

- Ixabepilone + capecitabine (category 2B)

PREFERRED FIRST-LINE AGENTS FOR HER2-POSITIVE DISEASE

- Trastuzumab with:**
- Paclitaxel ± carboplatin
 - Docetaxel
 - Vinorelbine
 - Capecitabine

PREFERRED AGENTS FOR TRASTUZUMAB-EXPOSED HER2-POSITIVE DISEASE

- Lapatinib + capecitabine
- Trastuzumab + other first-line agents
- Trastuzumab + capecitabine
- Trastuzumab + lapatinib (without cytotoxic therapy)

¹There is no compelling evidence that combination regimens are superior to sequential single agents.
²A single randomized clinical trial documents superior time to progression with the combination of bevacizumab plus paclitaxel compared with paclitaxel alone for first line chemotherapy of metastatic disease.

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.
Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any cancer patient is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

Version 2.2010: 03/16/2010 © 2010 National Comprehensive Cancer Network, Inc. All rights reserved. These guidelines and this illustration may not be reproduced in any form without the express written permission of NCCN.

BINV-M
1 of 6

¹Hormonal therapy is for endometrioid histologies only (ie, not for papillary serous carcinoma, clear cell carcinoma, or carcinosarcoma).
²Chemotherapy regimens are for endometrioid histologies, papillary serous carcinoma, or clear cell carcinoma. A few of them also be used for carcinosarcoma, as indicated.

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.
Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any cancer patient is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

Version 1.2010: 10/20/09 © 2009 National Comprehensive Cancer Network, Inc. All rights reserved. These guidelines and this illustration may not be reproduced in any form without the express written permission of NCCN.

CERV-A

Было ли это персонализированной онкологией?

Здравствуйте!

Мы Шарик и Рыжик

нас часто путают

Создай свою котоматрицу на kotomatrix.ru

Это были лишь разговоры о индивидуализации и прецизионной медицине

Бесконечное дробление подтипов и множество вариантов лечения, которые мы не можем «связать» между собой

Подтипы опухоли

Варианты химиотерапии

Вариантов много, но все они эмпирические, вариант лечения и вариант опухоли не связаны между собой

Со студенческих лет мы помнили, что онкология это особенная специальность, т.к.:

- Наши диагнозы и лечение основываются исключительно на морфологическом исследовании субстрата опухоли
- Без биопсии нет
 - Диагноза
 - Лечение
 - Онкологии
 - Врача-онколога
 - ...

Вы знаете, а у Вас
рак...

Но если исследование опухолевой ткани не влияет на тактику, то зачем?...

Удельный вес больных с диагнозом, подтвержденным морфологически, от числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования в России в 2005-2015 гг., % *

Локализация, нозологическая форма	Код МКБ 10	Годы										
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Все злокач. новообразования	C00-96	80,7	81,8	82,9	83,2	84,5	85,3	85,8	86,7	87,7	88,8	90,4
Губа	C00	97,2	97,4	96,4	96,8	96,9	96,2	97,7	98,5	98,3	98,2	98,5
Полость рта**	C01-09.46.2	-	-	-	-	-	-	97,0	96,1	96,5	96,4	97,2
Глотка**	C10-13	-	-	-	-	-	-	95,1	94,2	95,4	95,8	96,5
Пищевод	C15	75,5	77,5	78,2	79,8	81,3	81,7	84,0	86,1	87,9	89,4	90,2
Желудок	C16	80,2	80,7	82,0	83,7	85,4	87,0	86,5	88,9	90,2	91,0	92,4
Ободочная кишка	C18	79,1	80,4	81,7	83,3	84,7	85,9	85,2	88,1	89,5	90,2	91,2
Прямая кишка, ректосигм. соед, анус	C19-21	87,6	88,4	88,7	89,1	90,4	91,0	91,9	92,5	93,1	93,9	94,6
Печень и внутрпеч. желч. прот.**	C22	-	-	-	-	-	-	46,6	48,9	51,3	56,4	58,1
Поджелудочная железа**	C25	-	-	-	-	-	-	47,1	44,2	48,8	51,8	55,8
Гортань	C32	90,8	90,4	92,0	92,2	92,8	93,3	94,9	94,5	94,6	95,0	95,4
Трахея, бронхи, легкое	C33,34	56,2	57,6	58,3	58,7	61,0	63,0	64,2	65,3	68,6	70,7	74,0
Кости и суставные хрящи**	C40,41	86,6	88,0	87,5	87,6	88,9	89,7	82,8	83,0	82,1	84,3	84,3
Меланома кожи	C43	97,4	97,7	97,4	97,8	97,9	98,0	97,9	98,4	98,3	98,0	98,2
Кожа (кроме меланомы)	C44,46.0	98,4	98,8	98,5	98,6	99,0	98,8	99,0	98,4	98,6	98,9	99,1
Соединительная и др. мягкие ткани**	C46.1.3.7-9; 47,49	-	-	-	-	-	-	93,3	94,5	93,9	94,3	95,1
Молочная железа	C50	94,4	94,4	95,4	95,2	95,7	95,7	96,6	96,3	96,5	96,6	97,5
Шейка матки	C53	97,5	96,5	97,5	96,9	97,6	97,5	98,1	98,2	97,7	98,0	98,3
Тело матки	C54	96,5	96,0	96,4	96,7	96,5	96,5	97,0	97,5	97,8	97,8	97,9
Яичник	C56	85,7	86,9	87,7	88,4	88,4	89,1	90,1	91,0	91,5	91,5	92,4
Предстательная железа	C61	83,6	84,4	88,1	89,0	91,2	90,2	92,0	91,9	93,9	93,5	94,5
Почка**	C64	-	-	-	-	-	-	75,5	76,5	77,0	78,6	81,9
Мочевой пузырь	C67	81,9	82,3	83,8	84,2	86,1	86,6	87,6	88,4	89,5	89,7	91,6
Щитовидная железа	C73	97,0	96,7	96,8	96,8	97,5	97,5	97,9	97,9	97,9	97,7	98,4
Лимфатич. и кроветворная ткань	C81-96	94,9	94,9	95,6	96,2	96,9	96,5	96,3	95,5	98,4	100,0	100,0

Каждый 5 без морфологического подтверждения

А где-то и каждый первый...

Десятый....

* - с 2011 г. в формуле статистической статистики международной системы классификации болезней (кроме базисной)

Основной фактор, определявший вариант лечения, - статус по ECOG...

THERAPY FOR RELAPSE

ECOG 1-2 – лечим рак
ECOG 3-4 – симптоматическая терапия

^dSee [Chemotherapy Regimens for Recurrent or Metastatic Cervical Cancer \(CERV-A\)](#).

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.
Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any cancer patient is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

А если уж лечение можно провести, то без разницы, какой это подтип!

Рак единое заболевание, требующее единых подходов, и если удалось при одной опухоли – удастся и при других

Появление и прогрессирование опухоли обусловлено не просто «быстрым делением клеток», а активацией и/или торможением множества сигнальных путей, особенностями «взаимодействия с организмом»...

Визуальный фенотип опухоли

«Внутренняя жизнь» опухоли

И ЭТИ ПУТИ МОГУТ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ОПУХОЛИ К ОПУХОЛИ, И ОТ БОЛЬНОГО К БОЛЬНОМУ

Отличительные признаки опухоли

=

мишени для противоопухолевой терапии

Именно благодаря этому
подходу последние стали
первыми!

Еще 10 лет назад у половины больных раком легкого не было морфологического подтверждения диагноза...

Удельный вес больных с диагнозом, подтвержденным морфологически, от числа больных с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования в России в 2005-2015 гг., % *

Локализация, нозологическая форма	Код МКБ 10	Годы										
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Все злокач. новообразования	C00-96	80,7	81,8	82,9	83,2	84,5	85,3	85,8	86,7	87,7	88,8	90,4
Губа	C00	97,2	97,4	96,4	96,8	96,9	96,2	97,7	98,5	98,3	98,2	98,5
Полость рта**	C01-09,46.2	-	-	-	-	-	-	97,0	96,1	96,5	96,4	97,2
Глотка**	C10-13	-	-	-	-	-	-	95,1	94,2	95,4	95,8	96,5
Пищевод	C15	75,5	77,5	78,2	79,8	81,3	81,7	84,0	86,1	87,9	89,4	90,2
Желудок	C16	80,2	80,7	82,0	83,7	85,4	87,0	86,5	88,9	90,2	91,0	92,4
Ободочная кишка	C18	79,1	80,4	81,7	83,3	84,7	85,9	85,2	88,1	89,5	90,2	91,2
Прямая кишка, ректосигм. соед, анус	C19-21	87,6	88,4	88,7	89,1	90,4	91,0	91,9	92,5	93,1	93,9	94,6
Печень и внутрпеч. желч. прот.**	C22	-	-	-	-	-	-	46,6	48,9	51,3	56,4	58,1
Поджелудочная железа**	C25	-	-	-	-	-	-	47,1	44,2	48,8	51,8	55,8
Гортань	C32	90,8	90,4	92,0	92,2	92,8	93,3	94,9	94,5	94,6	95,0	95,4
Трахея, бронхи, легкое	C33,34	56,2	57,6	58,3	58,7	61,0	63,0	64,2	65,3	68,6	70,7	74,0
Кости и суставные хрящи**	C40,41	86,6	88,0	87,5	87,6	88,9	89,7	82,8	83,0	82,1	84,3	84,3
Меланома кожи	C43	97,4	97,7	97,4	97,8	97,9	98,0	97,9	98,4	98,3	98,0	98,2
Кожа (кроме меланомы)	C44,46.0	98,4	98,8	98,5	98,6	99,0	98,8	99,0	98,4	98,6	98,9	99,1
Соединительная и др. мягкие ткани**	C46.1.3.7-9; 47,49	-	-	-	-	-	-	93,3	94,5	93,9	94,3	95,1
Молочная железа	C50	94,4	94,4	95,4	95,2	95,7	95,7	96,6	96,3	96,5	96,6	97,5
Шейка матки	C53	97,5	96,5	97,5	96,9	97,6	97,5	98,1	98,2	97,7	98,0	98,3
Тело матки	C54	96,5	96,0	96,4	96,7	96,5	96,5	97,0	97,5	97,8	97,8	97,9
Яичник	C56	85,7	86,9	87,7	88,4	88,4	89,1	90,1	91,0	91,3	91,5	92,4
Предстательная железа	C61	83,6	84,4	88,1	89,0	91,2	90,2	92,0	91,9	93,9	93,5	94,5
Почка**	C64	-	-	-	-	-	-	75,5	76,5	77,0	78,6	81,9
Мочевой пузырь	C67	81,9	82,3	83,8	84,2	86,1	86,6	87,6	88,4	89,5	89,7	91,6
Щитовидная железа	C73	97,0	96,7	96,8	96,8	97,5	97,5	97,9	97,9	97,9	97,7	98,4
Лимфатич. и кроветворная ткань	C81-96	94,9	94,9	95,6	96,2	96,9	96,5	96,3	95,5	98,4	100,0	100,0

* - с 2011 г. в формуле статистической статистики международной системы классификации болезней (кроме базисной)

А зачем, если основной фактор, определявший вариант лечения НМРЛ в то время – статус по ECOG...

THERAPY FOR RECURRENCE AND METASTASIS

FIRST-LINE THERAPY

^qSee [Systemic Therapy for Advanced or Metastatic Disease \(NSCL-E\)](#).

^tPerformance status (PS) 2 patients have greater toxicity and potential for lower benefit than PS 0-1 patients.

^uCriteria for treatment with bevacizumab + chemotherapy: non-squamous NSCLC, no history of hemoptysis, no CNS metastases, no ongoing therapeutic anticoagulation. Bevacizumab should not be given as a single agent.

^vAny regimen with a high risk of thrombocytopenia and the potential risk of bleeding should be used with caution in combination with bevacizumab.

^wSome institutions advocate imaging (CT) studies to evaluate tumor response after the first course.

Да, выбор был... Но выбор был между
ПЛОХИМ И ПЛОХИМ...

Общая выживаемость

Время до прогрессирования

Figure 2. Kaplan-Meier Estimates of Overall Survival (Panel A) and the Time to Progression of Disease (Panel B) in the Study Patients, According to the Assigned Treatment.

Но потом ситуация вдруг резко поменялась

- Таблетки превзошли даже скальпель!

Радикально оперированные больные
ранним НМРЛ (I-III стадии)

Arriagada R, Bergman B, Dunant A, Le Chevalier T, Pignon JP, et al. (2004) Cisplatin-based adjuvant chemotherapy in patients with completely resected non-small-cell lung cancer. *N Engl J Med* 350: 351–360

Метастатический ALK-позитивный
НМРЛ, терапия кризотинибом

Solomon BJ, Kim DW, Wu YL, et al. Final overall survival analysis from a study comparing first-line crizotinib versus chemotherapy in ALK-Mutation-positive non-small-cell lung cancer. *J Clin Oncol* 2018;JCO.2017.77.479
10.1200/JCO.2017.77.4794

К 2020 стали даже поговаривать о том, что лечение распространенных стадий НМРЛ уже вносит свой вклад в снижение смертности

RosOncoWeb

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА КЛИНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ
23 ГОДА (1997-2020) ТОЛЬКО ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В ОНКОЛОГИИ

Найти

[Об обществе](#) | [Мероприятия](#) | [Рабочие группы](#) | [Газета](#) | [Журнал](#) | [Общественная деятельность](#) | [Контакты](#)

- ▶ [Архив выступлений и публикации](#)
- ▶ [Практические рекомендации](#)
- ▶ [Клинические исследования](#)
- ▶ [Обучение по химиотерапии](#)
- ▶ [Правда о российской онкологии](#)
- ▶ [Врач и закон](#)
- ▶ [Онкологические ресурсы в сети](#)
- ▶ [Гранты и конкурсы](#)
- ▶ [Библиотека](#)

Новости онкологии

21.01.2020

Значительное ускорение темпов снижения смертности от онкологических заболеваний в США. Неужели, наконец, «праздник» системной терапии распространенных стадий?

Жуков Николай Владимирович
*Руководитель отдела междисциплинарной онкологии
ФГБУ «НМИЦ Детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д.Рогачева»,
доцент кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук,
Москва*

По отношению к другим медицинским специальностям онкология долго находилась в аутсайдерах в отношении темпов (и даже самой возможности) снижения смертности. В то время как кардиологи рапортовали о снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на десятки процентов, онкологическая смертность лишь замедляла рост или (в лучшем случае) уменьшалась в пределах статистической погрешности.

Однако в настоящее время в странах, ведущих продуманную «антираковую» стратегию и обладающих на это достаточными ресурсами ситуация кардинально меняется. Так например в США уже в течение многих лет

Чего, кстати, от нас настоятельно требует партия и правительство! И требует весьма решительно

⚠ Небезопасно | www.vest-news.ru/news/110267

Google Переводчик Chemotherapy Prot... eLIBRARY.RU - Жук... Visiontracker citi Citibank Online

[Главная](#) — [Новости](#) — Президент РФ Владимир Путин предложил реализовать национальную программу по борьбе с раком

Президент РФ Владимир Путин предложил реализовать национальную программу по борьбе с раком

12:15, 02 марта 2018

https://digital.ac.gov.ru/news/4341/

Google Переводчик Chemotherapy Prot... eLIBRARY.RU - Жук... Visiontracker citi Citibank Online - Gmail

О национальной программе ▾ Меры поддержки [Новости](#) [Контакты](#)

Владимир Путин: персональная ответственность – вот что такое национальные проекты

25 февраля 2020

Глава государства в интервью ТАСС рассказал, чем нацпроекты отличаются от госпрограмм и заверил, что каждый находится под его постоянным контролем

Что же изменилось? Появились эффективные препараты? Да, безусловно!

- Анти-ALK
 - Кризотиниб
 - Алектиниб
 - Церитиниб
 - Бригатиниб
 - Лорлатиниб
- Анти-EGFR
 - Гефитиниб
 - Эрлотиниб
 - Афатиниб
 - Дакометиниб
 - Осимертиниб
- Анти-NTRK
 - Ларотректиниб
 - Энтректиниб
- Анти-BRAF
 - Дабрафениб/
траметиниб
 - Вемурафениб
- Анти-ROS1
 - Кризотиниб
 - Энтректиниб
 - Церитиниб
 - Лорлатиниб
- Анти-MET
 - Капматиниб
 - Тепотиниб
 - Кризотиниб
- Анти-RET
 - Селперкатиниб
 - Пралсетиниб
 - Кабазантиниб
 - Вандетаниб
- Анти-PD1/PD-L1
 - Пембролизумаб
 - Ниволумаб
 - Атезолизумаб
 - Цемиплимаб
 - Дурвалумаб
- Анти-CTLA-4
 - Ипилимумаб

Но главное, что это эффективные препараты в ПРАВИЛЬНОЙ популяции, имеющей для них мишень!

Эффективность различных режимов химиотерапии при НМРЛ (I линия)

Вариант опухоли (молекулярная мишень) является прямым выходом на вариант лечения

Вариант мишени

Вариант терапии

Вариант опухоли предсказывает эффект лечения

5 лет – 0%

Метастатический ALK-позитивный НМРЛ, терапия кризотинибом

144	128	111	98	89	79	65	51	36	20	8	1	0
131	118	100	89	82	73	63	46	31	21	11	1	0

Kim DW, Kim BJ, Kim DW, Wu YL, et al. Final overall survival analysis study comparing first-line crizotinib versus chemotherapy in ALK mutation-positive non-small-cell lung cancer. J Clin Oncol. 2017;77:4791-4799.

5 лет – 55%

Мишень можно (и нужно) определять,
перед тем, как выстрелить!

От единой таблетки для всех раков к набору препаратов для разных «орфанных» опухолей с локализацией в одном и том же органе!

Каждому своя таблетка!

И подходы стали меняться при многих опухолях!

Персонализированная медицина это там, где при выборе между опциями перед «стрелочкой» стоит молекулярный (или любой другой) признак, позволяющий осмысленно выбрать вид лечения

Где-то больше...

Где-то меньше...

КАЖДА
ЕСЛИ, ТО...

Printed by Nikolay Zhukov on 9/30/2020 3:10:59 PM. For personal use only. Not approved for distribution. Copyright © 2020 National Comprehensive Cancer Network, Inc. All Rights Reserved.

NCCN National Comprehensive Cancer Network® NCCN Guidelines Version 8.2020 Non-Small Cell Lung Cancer

CLINICAL PRESENTATION	HISTOLOGIC SUBTYPE ^a	TESTING ^d	TESTING RESULTS ^d
Advanced or metastatic disease	Adenocarcinoma Large cell NSCLC not otherwise specified (NOS)	Molecular testing EGFR mutation testing (category 1) ALK testing (category 1) ROS1 testing BRAF testing MET exon 14 skipping testing RET testing Testing should be conducted as part of broad molecular profiling ^{h,i} PD-L1 testing (category 1)	Sensitizing EGFR mutation positive (see NSCL-19) ALK positive (see NSCL-22) ROS1 positive (see NSCL-25) BRAF V600E positive (see NSCL-26) MET exon 14 skipping mutation positive (see NSCL-28) RET positive (see NSCL-29) PD-L1 ≥1% and EGFR, ALK, ROS1, BRAF, MET exon 14 skipping mutation, and RET negative ^h (see NSCL-30) PD-L1 <1% and EGFR, ALK, ROS1, BRAF, MET exon 14 skipping mutation, and RET negative ^h (see NSCL-32)
	Squamous cell carcinoma	Molecular testing Consider EGFR mutation ^{mm} and ALK testing in never smokers or small biopsy specimens, or mixed histology ⁿⁿ Consider ROS1, BRAF, MET exon 14 skipping, and RET testing in small biopsy specimens or mixed histology Testing should be conducted as part of broad molecular profiling ^{h,i} PD-L1 testing (category 1)	Sensitizing EGFR mutation positive (see NSCL-19) ALK positive (see NSCL-22) ROS1 positive (see NSCL-25) BRAF V600E positive (see NSCL-26) MET exon 14 skipping mutation positive (see NSCL-28) RET positive (see NSCL-29) PD-L1 ≥1% and EGFR, ALK, ROS1, BRAF, MET exon 14 skipping mutation, and RET negative ^h (see NSCL-30) PD-L1 <1% and EGFR, ALK, ROS1, BRAF, MET exon 14 skipping mutation, and RET negative ^h (see NSCL-32)

See footnotes on NSCL-18A

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.
Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any patient with cancer is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

Version 8.2020, 09/30/20 © 2020 National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), all rights reserved. NCCN Guidelines® and this illustration may not be reproduced in any form without the express written permission of NCCN.

NSCL-18

Printed by Nikolay Zhukov on 11/5/2020 4:44:55 PM. For personal use only. Not approved for distribution. Copyright © 2020 National Comprehensive Cancer Network, Inc. All Rights Reserved.

NCCN National Comprehensive Cancer Network® NCCN Guidelines Version 6.2020 Invasive Breast Cancer

NCCN Guidelines Index
Table of Contents
Discussion

SYSTEMIC TREATMENT OF RECURRENT OR STAGE IV (M1) DISEASE

```
graph TD
    A[Recurrent or stage IV (M1) diseasemm] --> B[Bone disease present]
    A --> C[Bone disease not present]
    B --> D[ER- and/or PR-positive; HER2-negatived,cc]
    B --> E[ER- and/or PR-positive; HER2-positived,cc]
    C --> F[ER- and PR-negative; HER2-positived,cc]
    C --> G[ER- and PR-negative; HER2-negatived,cc]
    D --> H[See BINV-20]
    E --> I[See BINV-22]
    F --> J[See BINV-24]
    G --> K[See BINV-25]
```

^d See Principles of Biomarker Testing (BINV-A).
^{cc} Although not specifically indicated for endocrine therapies, there are more limited data on the use of endocrine therapy in ER-low-positive (1%–10%) results. The ER-low-positive group is heterogeneous and reported biologic behavior often similar to ER-negative disease. This group should be considered in decision-making for other adjuvant therapy as well as in the overall treatment pathway. See Principles of Biomarker Testing (BINV-A).

^{mm} The role and timing of surgical removal of the primary tumor in patients presenting with de novo stage IV (M1) is the subject of ongoing investigations and must be individualized. Performance of local breast surgery and/or RT is reasonable in select patients responding to initial systemic therapy.
ⁿⁿ Denosumab, zoledronic acid, or pamidronate (all with calcium and vitamin D supplementation) should be given (category 1) in addition to chemotherapy or endocrine therapy if bone metastasis is present, expected survival is ≥3 months, and renal function is adequate. Patients should undergo a dental examination with preventive dentistry prior to initiation of this therapy. The optimal schedule for zoledronic acid is every 12 weeks.

Но является ли текущая ситуация пределом наших мечтаний о персонализированной онкологии?

Вчерашние лидеры таргетной терапии вдруг оказались в аутсайдерах... Почти...

НМРЛ 4 месяца плюс 2 мишени

Чтобы была понятна скорость эволюции подходов к лечению распространенного НМРЛ...

Экспертный совет по НМРЛ (февраль, 2020)

+4 МЕСЯЦА

Наше мероприятие (июль, 2020)

РМЖ...

РЭ/РП, HER2

VS

2006

2010

2015

2019...

Published by NCCN, Update on 3/12/2020. For personal use only. Not approved for distribution. Copyright © 2020 National Cancer Network, Inc. All Rights Reserved.

NCCN National Comprehensive Cancer Network®

NCCN Guidelines Version 3.2020

Non-Small Cell Lung Cancer

NCCN Guidelines Index
Table of Contents
Discussion

CLINICAL PRESENTATION	HISTOLOGIC SUBTYPE ^a	TESTING ^b	TESTING RESULTS ^c
Advanced or metastatic disease	Adenocarcinoma	Molecular testing + EGFR mutation testing (category 1) + ALK testing (category 1) + ROS1 testing + BRAF testing + Testing should be conducted as part of broad molecular profiling ^d + PD-L1 testing (category 1)	Sensitizing EGFR mutation positive (see NSCL-13) ALK positive (see NSCL-22) ROS1 positive (see NSCL-23) BRAF V600E positive (see NSCL-24) PD-L1 ≥1% and EGFR, ALK, ROS1 negative ^e (see NSCL-31) EGFR, ALK, ROS1, BRAF negative ^f PD-L1 <1% (see NSCL-30)
	Squamous cell carcinoma	Molecular testing + Consider EGFR mutation ^g and ALK testing in never smokers or small biopsy specimens, or mixed histology ^h + Consider ROS1 and BRAF testing in small biopsy specimens or mixed histology + Testing should be conducted as part of broad molecular profiling ^d + PD-L1 testing (category 1)	Sensitizing EGFR mutation positive (see NSCL-13) ALK positive (see NSCL-22) ROS1 positive (see NSCL-23) BRAF V600E positive (see NSCL-24) PD-L1 ≥1% and EGFR, ALK, ROS1, BRAF negative ^e (see NSCL-31) EGFR, ALK, ROS1, BRAF negative ^f PD-L1 <1% (see NSCL-30)

^a See Protocols of Pathologic Review (NSCL-14).
^b Tsimbali Z, Greer JA, Mukkamala A, et al. Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer. *N Engl J Med* 2019;380:755-762.
^c If there is insufficient tissue to allow testing for all of EGFR, ALK, ROS1, and BRAF, repeat biopsy and/or plasma testing should be done. If these are not feasible, treatment is guided by available results and, if incorrect, these patients are treated as though they do not have driver oncogenes.
^d See Protocols of Molecular Profiling (NSCL-15).
^e The NCCN NSCLC Guidelines Panel strongly advises broader molecular profiling with the goal of testing rare driver mutations for which effective drugs may already be available, or to appropriately counsel patients regarding the availability of clinical trials. Broad molecular profiling is a key component of the improvement of care of patients with NSCLC. See Emerging Biomarkers to Identify Patients for Therapies (NSCL-16).
^f Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated. Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any patient with cancer is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.
^g Testing should include the neurotrophic tyrosine receptor kinase (NTRK) gene panel, if positive, see NSCL-27.
^h In patients with squamous cell carcinoma, the observed incidence of EGFR mutations is 2.7% with a confidence that the true incidence of mutations is less than 3.4%. The frequency of EGFR mutations does not justify routine testing of all tumor specimens. Forsee JA, Sharma G, Samford S, et al. The catalogue of oncogenic mutations in cancer (COGIC): Can Protoc Hum Genet 2008 (chapter 10), unit 10.1.
ⁱ For more information, see: Simon CL, et al. Response to erlotinib in patients with EGFR mutant advanced non-small cell lung cancer with a squamous or squamous-like component. *Int J Cancer Ther* 2012;11:2500-2504.

NSCL-15

NCCN National Comprehensive Cancer Network®

NCCN Guidelines Version 6.2020

Non-Small Cell Lung Cancer

NCCN Guidelines Index
Table of Contents
Discussion

CLINICAL PRESENTATION	HISTOLOGIC SUBTYPE ^a	TESTING ^b	TESTING RESULTS ^c
Advanced or metastatic disease	Adenocarcinoma	Molecular testing + EGFR mutation testing (category 1) + ALK testing (category 1) + ROS1 testing + BRAF testing + MET exon 14 skipping testing + RET testing + Testing should be conducted as part of broad molecular profiling ^d + PD-L1 testing (category 1)	Sensitizing EGFR mutation positive (see NSCL-13) ALK positive (see NSCL-22) ROS1 positive (see NSCL-23) BRAF V600E positive (see NSCL-24) MET exon 14 skipping mutation positive (see NSCL-25) RET positive (see NSCL-26) PD-L1 ≥1% and EGFR, ALK, ROS1, BRAF, MET exon 14 skipping mutation, and RET negative ^e (see NSCL-30)
	Squamous cell carcinoma	Molecular testing + Consider EGFR mutation ^g and ALK testing in never smokers or small biopsy specimens, or mixed histology ^h + Consider ROS1, BRAF, MET exon 14 skipping, and RET testing in small biopsy specimens or mixed histology + Testing should be conducted as part of broad molecular profiling ^d + PD-L1 testing (category 1)	Sensitizing EGFR mutation positive (see NSCL-13) ALK positive (see NSCL-22) ROS1 positive (see NSCL-23) BRAF V600E positive (see NSCL-24) MET exon 14 skipping mutation positive (see NSCL-25) RET positive (see NSCL-26) PD-L1 ≥1% and EGFR, ALK, ROS1, BRAF, MET exon 14 skipping mutation, and RET negative ^e (see NSCL-30)

^a See Protocols of Pathologic Review (NSCL-14).
^b Tsimbali Z, Greer JA, Mukkamala A, et al. Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer. *N Engl J Med* 2019;380:755-762.
^c If there is insufficient tissue to allow testing for all of EGFR, ALK, ROS1, and BRAF, repeat biopsy and/or plasma testing should be done. If these are not feasible, treatment is guided by available results and, if incorrect, these patients are treated as though they do not have driver oncogenes.
^d See Protocols of Molecular Profiling (NSCL-15).
^e The NCCN NSCLC Guidelines Panel strongly advises broader molecular profiling with the goal of testing rare driver mutations for which effective drugs may already be available, or to appropriately counsel patients regarding the availability of clinical trials. Broad molecular profiling is a key component of the improvement of care of patients with NSCLC. See Emerging Biomarkers to Identify Patients for Therapies (NSCL-16).
^f Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated. Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any patient with cancer is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.
^g Testing should include the neurotrophic tyrosine receptor kinase (NTRK) gene panel, if positive, see NSCL-27.
^h In patients with squamous cell carcinoma, the observed incidence of EGFR mutations is 2.7% with a confidence that the true incidence of mutations is less than 3.4%. The frequency of EGFR mutations does not justify routine testing of all tumor specimens. Forsee JA, Sharma G, Samford S, et al. The catalogue of oncogenic mutations in cancer (COGIC): Can Protoc Hum Genet 2008 (chapter 10), unit 10.1.
ⁱ For more information, see: Simon CL, et al. Response to erlotinib in patients with EGFR mutant advanced non-small cell lung cancer with a squamous or squamous-like component. *Int J Cancer Ther* 2012;11:2500-2504.

NSCL-16

Что называется, почувствуйте разницу!

Заболевание	Выбор препаратов	Факторы отбора на лечение
Рак молочной железы	Трастузумаб, пертузумаб, Т-DM1, лапатиниб, бевацизумаб, эверолимус, палбоциклиб, рибоциклиб, абемациклиб, олапариб, талазопариб, атезолизумаб, эндокринотерапия, трастузумаб-дерукстекан, >50 режимов химиотерапии	<ol style="list-style-type: none">1. РЭ/ПП2. HER2
НМРЛ	Гефитиниб, эрлотиниб, афатиниб, осимертиниб, бевацизумаб, кризотиниб, алектиниб, церитиниб, бригатиниб, ларотректиниб, энтректиниб, пембролизумаб, ниволумаб, атезолизумаб, дурвалумаб, дабрафениб/траметиниб, трастузумаб-дерукстекан, нинтеданиб,~15 режимов химиотерапии	<ol style="list-style-type: none">1. EGFR2. ALK3. ROS-14. PD-L15. BRAF V600E6. NTRK7. MET8. RET9. HER210. MSI11. TMB12. ...

Там, где «пусто» – это потому, что предсказательных факторов нет, или потому, что мы их просто не ищем (не определяем)?

И забрезжил ли свет надежды над РМЖ и онкогинекологическими опухолями?

Когда хочется сказать ВАУ!

От грустной вести о 80% вероятности развития рака молочной железы и 40% вероятности рака яичников и необходимости профилактической хирургии к долгожданному прорыву в терапии

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МАСТЭКТОМИЯ ПРИ МУТАЦИИ ГЕНОВ BRCA

Printed by Nikolay Zhukov on 5/13/2021 12:09:24 PM. For personal use only. Not approved for distribution. Copyright © 2021 National Comprehensive Cancer Network, Inc., All Rights Reserved.

NCCN Guidelines Version 1.2021 Epithelial Ovarian Cancer/Fallopian Tube Cancer/ Primary Peritoneal Cancer

[NCCN Guidelines Index](#)
[Table of Contents](#)
[Discussion](#)

^a Imaging performed with oral and IV contrast unless contraindicated.

^g In the absence of a BRCA1/2 mutation, homologous recombination (HR) status may provide information on the magnitude of benefit of PARP inhibitor (PARPi) therapy (See OV-8).

^m See Principles of Systemic Therapy (OV-C) and Management of Drug Reactions (OV-D).

[†] Post-primary treatment recommendations for stage II–IV high-grade serous or grade 2/3 endometrioid carcinoma; consider for clear cell carcinoma or carcinosarcoma with a BRCA1/2 mutation.

^w No definitive evidence of disease.

^x Data are limited for maintenance therapy with a PARPi for patients with stage II disease.

^y After first-line therapy with bevacizumab, data are limited on maintenance therapy with a single-agent PARPi (olaparib or niraparib) for patients with a germline or somatic BRCA1/2 mutation. However, based on the magnitude of benefit of PARPi maintenance therapy for other subgroups, single-agent PARPi can be considered.

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.
Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any patient with cancer is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

Version 1.2021, 02/26/21 © 2021 National Comprehensive Cancer Network (NCCN). All rights reserved. NCCN Guidelines® and this illustration may not be reproduced in any form without the express written permission of NCCN.

Такого я не видел давно... Очень давно!

- Поддерживающая терапия олапарибом у больных раком яичников с наличием патогенной мутации BRCA, завершивших платино-содержащую терапию I линии

Различия в медиане выживаемости...
3,5 ГОДА!

<https://www.esmo.org/oncology-news/olaparib-maintenance-reduces-the-risk-of-recurrence-in-newly-diagnosed-patients-with-advanced-ovarian-cancer-harboring-a-brca-mutation>

Стал потихоньку «исправляться» РМЖ

Заболевание	Доступные препараты	Доступные мишени
Рак молочной железы	Трастузумаб, пертузумаб, Т-DM1, лапатиниб, бевацизумаб, эверолимус, палбоциклиб, рибоциклиб, абемациклиб, олапариб, талазопариб, атезолизумаб, алпелисиб, эндокринотерапия, трастузумаб-дерукстекан, >50 режимов химиотерапии	<ol style="list-style-type: none"> 1. РЭ/ПП 2. HER2 3. PD-L1 4. BRCA 5. PIK3CA 6. MSI 7. NTRK
НМРЛ	Гефитиниб, эрлотиниб, афатиниб, осимертиниб, бевацизумаб, кризотиниб, алектиниб, церитиниб, бригатиниб, ларотректиниб, энтректиниб, пембролизумаб, ниволумаб, атезолизумаб, дурвалумаб, дабрафениб/траметиниб, трастузумаб-дерукстекан, нинтеданиб, ...~15 режимов химиотерапии	<ol style="list-style-type: none"> 1. EGFR 2. ALK 3. ROS-1 4. PD-L1 5. BRAF V600E 6. NTRK 7. MET 8. RET 9. HER2 10. MSI 11. TMB

Здесь есть вопросы, но на фоне длительной многолетней стагнации... Это реальный прорыв

ADDITIONAL TARGETED THERAPIES AND ASSOCIATED BIOMARKER TESTING FOR RECURRENT UNRESECTABLE (LOCAL OR REGIONAL) OR STAGE IV (M1) DISEASE

Breast Cancer Subtype	Biomarker	Detection	FDA-Approved Agents	NCCN Category of Evidence	NCCN Category of Preference
Any ^a	<i>BRCA1</i> mutation <i>BRCA2</i> mutation	Germline sequencing	Olaparib Talazoparib	Category 1 Category 1	Preferred
HR-positive/ HER2-negative ^b	<i>PIK3CA</i> activating mutation	PCR (blood or tissue block if blood negative), molecular panel testing	Alpelisib + fulvestrant ^d	Category 1	Preferred second-line therapy
HR-negative/ HER2-negative ^c	PD-L1 expression • Threshold for positivity: ≥1% on tumor-infiltrating immune cells	IHC	Atezolizumab + albumin-bound paclitaxel ^e	Category 1	Preferred first-line therapy ^h
	PD-L1 expression • Threshold for positivity combined positive score ≥10		Pembrolizumab + chemotherapy (albumin-bound paclitaxel, paclitaxel, or gemcitabine and carboplatin) ^g	Category 1	
Any	<i>NTRK</i> fusion	FISH, NGS, PCR (tissue block)	Larotrectinib ⁱ Entrectinib ^j	Category 2A Category 2A	Useful in certain circumstances ^k
Any	MSI-H/dMMR TMB-H (≥10 muts/mb)	IHC, PCR (tissue block) NGS	Pembrolizumab ^g	Category 2A	Useful in certain circumstances ^k

^a Assess for germline *BRCA1/2* mutations in all patients with recurrent or metastatic breast cancer to identify candidates for PARP inhibitor therapy. While olaparib and talazoparib are FDA indicated in *HER2*-negative disease, the panel supports use in any breast cancer subtype associated with a germline *BRCA1* or *BRCA2* mutation.
^b For HR-positive/*HER2*-negative breast cancer, assess for *PIK3CA* mutations with tumor or liquid biopsy to identify candidates for alpelisib plus fulvestrant. *PIK3CA* mutation testing can be done on tumor tissue or ctDNA in peripheral blood (liquid biopsy). If liquid biopsy is negative, tumor tissue testing is recommended.
^c For TNBC, assess PD-L1 expression biomarker status on tumor-infiltrating immune cells to identify candidates for atezolizumab plus albumin-bound paclitaxel.
^d The safety of alpelisib in patients with Type 1 or uncontrolled Type 2 diabetes has not been established.
^e See NCCN Guidelines for Management of Immunotherapy-Related Toxicities.
^f Larotrectinib and entrectinib are indicated for the treatment of solid tumors that have an *NTRK* gene fusion without a known acquired resistance mutation and have no satisfactory alternative treatments or that have progressed following treatment.
^g Pembrolizumab is indicated for the treatment of patients with unresectable or metastatic, microsatellite instability-high (MSI-H) or mismatch repair deficient (dMMR) solid tumors, or TMB-H tumors that have progressed following prior treatment and who have no satisfactory alternative treatment options.
^h While available data are in the first-line setting, these regimens can be used for second and subsequent lines of therapy if PD-1/PD-L1 inhibitor therapy has not been previously used. If there is disease progression while on a PD-1/PD-L1 inhibitor, there are no data to support an additional line of therapy with another PD-1/PD-L1 inhibitor.
ⁱ While available data are in the first-line setting, these regimens can be used for second and subsequent lines of therapy if PD-1/PD-L1 inhibitor therapy has not been previously used. If there is disease progression while on a PD-1/PD-L1 inhibitor, there are no data to support an additional line of therapy with another PD-1/PD-L1 inhibitor.
^k While available data are in the first-line setting, these regimens can be used for second and subsequent lines of therapy if PD-1/PD-L1 inhibitor therapy has not been previously used. If there is disease progression while on a PD-1/PD-L1 inhibitor, there are no data to support an additional line of therapy with another PD-1/PD-L1 inhibitor.

Note: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.
 Clinical Trials: NCCN believes that the best management of any patient with cancer is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

BINV-R
1 OF 3

Олапариб при BRCAmut PMЖ, ВБП

N Engl J Med 2017; 377:523-533, DOI:10.1056/NEJMoa1706450

Алпелисид при PIK3CAmut люминальном PMЖ, ВБП

N Engl J Med 2019; 380:1929-1940 DOI: 10.1056/NEJMoa1813904

Атезолизумаб при PD-L1+ TH PMЖ, ОВ

И даже в области рака шейки матки...

National Comprehensive Cancer Network®

**NCCN Guidelines Version 1.2021
Cervical Cancer**

[NCCN Guidelines Index](#)
[Table of Contents](#)
[Discussion](#)

SYSTEMIC THERAPY FOR CERVICAL CANCER^a

Squamous Cell Carcinoma, Adenocarcinoma, or Adenosquamous Carcinoma			
Chemoradiation	Recurrent or Metastatic Disease		
	First-line Combination Therapy ^{b,c}	Possible First-line Single-agent therapy ^c	Second-line Therapy ^e
Preferred Regimens • Cisplatin • Carboplatin if patient is cisplatin intolerant	Preferred Regimens • Cisplatin/paclitaxel/bevacizumab ^{d,1} (category 1) • Carboplatin/paclitaxel/bevacizumab ^d Other Recommended Regimens • Cisplatin/paclitaxel (category 1) ^{2,3} • Carboplatin/paclitaxel ^{4,5} (category 1 for patients who have received prior cisplatin therapy) • Topotecan/paclitaxel/bevacizumab ^{d,1} (category 1) • Topotecan/paclitaxel ¹ • Cisplatin/topotecan ⁶	Preferred Regimens • Cisplatin ³ Other Recommended Regimens • Carboplatin ⁷ • Paclitaxel ^{8,9}	Preferred Regimens • Pembrolizumab for PD-L1-positive ^f or MSI-H/dMMR tumors ^{9,10} Other Recommended Regimens (All agents listed here are category 2B unless otherwise noted) • Bevacizumab ^d • Albumin-bound paclitaxel • Docetaxel • Fluorouracil • Gemcitabine • Ifosfamide • Irinotecan • Mitomycin • Pemetrexed • Topotecan • Vinorelbine Useful in Certain Circumstances • Pembrolizumab for TMB-H tumors ^h • Larotrectinib or entrectinib for <i>NTRK</i> gene fusion-positive tumors (category 2B)

^aCisplatin, carboplatin, docetaxel, and paclitaxel may cause drug reactions (See [NCCN Guidelines for Ovarian Cancer—Management of Drug Reactions \[OV-D\]](#)).

^bCost and toxicity should be carefully considered when selecting an appropriate regimen for treatment.

^cIf not used previously, these agents can be used as second-line therapy as clinically appropriate.

^dAn FDA-approved biosimilar is an appropriate substitute for bevacizumab.

^eReferences for second-line therapy are provided in the [Discussion](#).

^fRecommended for disease progression on or after chemotherapy in patients whose tumors express PD-L1 (CPS ≥1) as determined by an FDA-approved test.

^gSee [NCCN Guidelines for the Management of Immunotherapy-Related Toxicities](#).

Пембролизумаб при предлеченном PD-L1 позитивном РШМ

80% больных, достигших ремиссии, удержали ее более 1 года

Chung HC, Ros W, Delord JP, Perets R, Italiano A, Shapira-Frommer R, Manzuk L, Piha-Paul SA, Xu L, Zeigenfuss S, Pruitt SK, Leary A. Efficacy and Safety of Pembrolizumab in Previously Treated Advanced Cervical Cancer: Results From the Phase II KEYNOTE-158 Study. *J Clin Oncol*. 2019 Jun 10;37(17):1470-1478. doi: 10.1200/JCO.18.01265. Epub 2019 Apr 3. PMID: 30943124.

Не говоря про рак тела матки

Опухоли с высокой частотой микросателлитной нестабильности

MSI-H/dMMR, not the organ, defines the indication

Кишка? Нет, рак эндометрия!

Нельзя сказать, что у иммунотерапии в этом отношении все безоблачно!

Пембролизумаб при MSI-H/dMMR опухолях, исключая MSI-H/dMMR колоректальный рак

Изменение размеров опухоли на фоне терапии

B

Выживаемость без прогрессирования

Но за длительность ремиссий можно многое простить...

Когда вы слышите мутация BRAF V600E, о чем вы думаете?

- О возвышенном...
- О меланоме
- О щитовидной железе
- О раке легкого
- О, прости господи, нелангергансовом гистиоцитозе
- ...

Кто-то подумал про рак
яичников?

Тот был прав!

original report

BRAF Mutations in Low-Grade Serous Ovarian Cancer and Response to *BRAF* Inhibition

Tania Moujaber
Dariush Etemadmoghadam
Catherine J. Kennedy
Yoke-Eng Chiew
Rosemary L. Balleine
Catherine Saunders
Gerard V. Wain
Bo Gao
Russell Hogg
Sivatharsny Srirangan
Casina Kan
Sian Fereday
Nadia Traficante
Australian Ovarian Cancer Study
Ann-Marie Patch
John V. Pearson
Nicola Waddell
Sean M. Grimmond
Alexander Dobrovic
David D.L. Bowtell
Paul R. Harnett
Anna deFazio

abstract

Purpose Low-grade serous ovarian carcinoma (LGSC) responds poorly to chemotherapy and is characterized by activating mutations in the Ras sarcoma-mitogen-activated protein kinase (RAS-MAPK) pathway, including oncogenic *BRAF*. However, response to *BRAF* inhibitors is tumor-type specific. Significant improvement in survival is seen in patients with *BRAF*-mutant melanoma, but other cancer types, such as colorectal cancers, are generally less sensitive. We examined the frequency and characteristics of *BRAF*-mutated LGSC and described the response to treatment with *BRAF* inhibitors.

Patients and Methods Mutations were assessed in LGSC (N = 65) by using targeted, exome, and whole-genome sequencing. Patient characteristics, treatment, and clinical outcome were assessed, and the median follow-up time was more than 5 years. *BRAF* inhibitors were trialed in two patients with a somatic *BRAF* V600E mutation: one patient received dabrafenib monotherapy and was monitored clinically, biochemically (cancer antigen [CA]-125 levels), and with positron emission tomography (PET) imaging. Expression of the *BRAF* V600E protein in this patient was assessed by immunohistochemistry.

Results Among patients with LGSC, nine (13.8%) of 65 had a somatic *BRAF* mutation. Of the nine patients with *BRAF* mutation-positive LGSC, four experienced progressive disease that did not respond to conventional chemotherapy. Two of the patients experienced progression quickly and died as a result of disease progression, and two received targeted treatment. Two patients with *BRAF* V600E mutation received *BRAF* inhibitors at relapse and both achieved durable responses.

Conclusion *BRAF* mutations are not uncommon in patients with LGSC and should be routinely tested, because *BRAF* inhibitors can be an effective treatment for these patients. The results highlight the need for targeted treatment in this rare tumor type, and a prospective study is needed to formally assess the response rate and clinical benefit.

JCO Precis Oncol. © 2018 by American Society of Clinical Oncology

case report

BRAF Mutations Occur Infrequently in Ovarian Cancer but Suggest Responsiveness to *BRAF* and MEK Inhibition

INTRODUCTION

Ovarian cancer (OC) is the death from gynecologic malignancy in the developed world.¹ Although many studies have been devoted to identifying actionable oncogenic drivers, only a few genes are frequently mutated, particularly in high-grade serous ovarian cancer. The Cancer Genome Atlas reported that almost all primary HGSOCs harbor a low prevalence of recurrent

aira P. Campos

Большинство мишеней (потенциальных мишеней) для таргетной терапии встречаются редко... Для каждой не проведешь отдельный тест, если не знать, что ищешь в конкретной опухоли

Лишь небольшая доля генетических aberrаций является широко распространенной¹

PHC: personalised healthcare; RWD: real-world data.

1. Data on File. FMI data base query; 2. Gatalica, Z., et al. (2019) Mod Pathol 32:147–53; 3. Garralda, E., et al. (2019) Mol Oncol 13(3):549-557; 4. Burd, A., et al. (2019) Blood Adv 23; 3(14): 2237–2243; 5. Booth, C.M., et al. (2019) Nat Rev Clin Oncol 16:312–25.

Так стоит ли их определять и как же диагностические тесты (читая – персонализированная медицина) меняют судьбы больных?

Это конечно не рак молочной железы, даже не яичники... Более того, это не женщина. И даже не взрослый...

Но это о том, как один (ну, один, если это комплексное геномное профилирование, а так несколько тестов) тест может поменять судьбу пациента

Не всем везет с болезнью...

- Пациент 2003 г/р (18 лет на настоящее время)
- Заболел в возрасте 10 лет (**2013 год**), когда было отмечено выбухание мягкого неба и отек десен верхних зубов справа.
- Локальное лечение по месту жительства, резекция R1
- Морфологическое исследование: **Амелобластома (при пересмотре – амелобластная фиброма)**

Амелобластная фиброма

- Редкая, доброкачественная опухоль, состоящая из одонтогенного эпителия и мезенхимального компонента
- Единственный метод лечения – хирургический
 - Предпочтительно радикальное удаление (R0)
 - Однако, при необходимости калечащего вмешательства возможно субтотальное удаление, т.к. опухоль может самостоятельно регрессировать с окончанием пубертатного периода
- Возможно локальное рецидивирование и последующая трансформация в злокачественную опухоль
 - Эпителиальную (одонтогенные раки)
 - Мезенхимальную (амелобластная саркома)

Пациенту не повезло - непрерывно рецидивирующее течение и злокачественная трансформация опухоли

1 рецидив (2014)

Амелобластная фиброма - резекция R1

2 рецидив (2015)

Амелобластная фиброма – резекция R1

3 рецидив с трансформацией (2015)

Амелобластная фибросаркома

Локальное прогрессирование + появление опухолевых узлов в подвисочной и крылонебной
ямках

Терапия опухоли после злокачественной трансформации

Впервые госпитализирован в **онкологический** стационар
(НМИЦ онкологии им.Н.Н.Блохина)

Высокие дозы ифосфамида + доксорубицин → **ЧАСТИЧНАЯ РЕГРЕССИЯ**

Дактиномицин + этопозид + карбоплатин → **СТАБИЛИЗАЦИЯ**

Иринотекан + цисплатин → **СТАБИЛИЗАЦИЯ**

Резекция R0: амелобластная фибросаркома с минимальными признаками лечебного патоморфоза

Абсолютно химиорезистентная, непрерывно рецидивирующая, злокачественная опухоль

4 рецидив

2016 год – через 9 месяцев по данным (МРТ) вновь выявлены признаки наличия опухолевого процесса в височно-крыловидном пространстве справа

НМИЦ ДГОИ

декабрь 2016 года (4 рецидив)

- Впервые госпитализирован в отделение хирургии НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева (НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева) декабрь 2016 года
- Учитывая химиорезистентный анамнез, попытки химиотерапии не проводились.
- Решено в очередной раз предпринять попытку выполнить радикальное хирургическое лечение.

**Попытка очередной операции (29.12.2016) : амелобластная фибросаркома, резекция R1
Лучевая терапия на ложе опухоли**

В случае очередного рецидива, абсолютно проигранная, но абсолютно привычная ситуация.

- **Больной вполне сохранен**, свеж и полон сил
НО
- **Куративное лечение невозможно**, опухоль солидная, интенсифицировать химиотерапию дальше некуда, аллогенная трансплантация не показана...

Рекомендовать эмпирически что-нибудь «паллиативное» и отправить домой

Абсолютно понятно, что «таргетов», которые официально зарегистрированы для амелобластной саркомы, нет и скорее всего никогда не будет...

Но для некоторых таргетных препаратов имеются четкие предсказательные тесты, хоть и по другим показаниям

1. Антиангиогенные (мультикиназные)

1. Сорафениб
2. Сунитиниб
3. Пазопаниб
4. Акситиниб
5. Кабозантиниб
6. Ленватиниб
7. Регорафениб
8. Бевацизумаб
9. Афлиберцепт
10. Рамуцирумаб
11. Ленватиниб

2. m-TOR ингибиторы

1. Эверолимус
2. Темсиrolимус

3. CDK 4/6 ингибиторы

1. Рибоциклиб
2. Палбоциклиб
3. Абемоциклиб

4. Анти-EGFR

1. Цетуксимаб
2. Панитумумаб
3. Гефитиниб
4. Эрлотиниб

5. Осимертиниб

6. Афатиниб

5. Ингибиторы контрольных точек иммунитета

1. Авелумаб
2. Пембролизумаб
3. Ниволумаб
4. Ипилимумаб
5. Дурвалумаб
6. Атезоллиумаб

6. Анти-ALK

1. Кризотиниб
2. Алектиниб
3. Церитиниб
4. Лорнатиниб
5. Бригатиниб

7. Анти-HER2

1. Трастузумаб
2. Пертузумаб
3. Лапатиниб
4. T-DM1
5. Ниратиниб

8. Анти-hedgehog

1. Висмодегиб

9. Анти-RANKL

1. Деносумаб

10. Анти-c-kit (PDGFR)

1. Иматиниб
2. Дазатиниб

11. Анти-BRAF/MEK

1. Вемурафениб /кобиметиниб,
2. Дабрафениб /траметиниб
3. Энкорафениб/ бинемитиниб

12. Анти-ER

1. Тамоксифен
2. Анастрозол
3. Летрозол
4. Экземестан
5. Гозерелин
6. Фулвестрант

И мы закинули сетку... Какую смогли на ТОТ МОМЕНТ

- Поиск “**druggable mutations**” - определение молекулярно-генетических маркеров чувствительности к таргетным препаратам, доступным на рынке, но зарегистрированным по другим показаниям

Технология поиска
Помесь ежа с зонтиком...

И мы, таки, нашли... BRAF V600E

Проведенный анализ выявил наличие активирующей **мутации V600E в гене BRAF**, предсказывающей высокую чувствительность к таргетным препаратам при многих опухолях других локализаций (меланома, рак легкого, анапластический рак щитовидной железы)

Меланома

До лечения

Через 15 недель
терапии

И когда случился очередной рецидив мы были готовы...
Почти...

ПЭТ/КТ

Очаг накопления в образовании нижней челюсти справа с распространением в крылонебную ямку, парафарингеальное пространство справа, мягкие ткани щечной области и мягкие ткани шеи

Полная трансформация опухоли, но с сохранением мишени!

Дебют заболевания – амелобластная фиброма, доброкачественный эпителиальный и мезенхимальный компоненты

Рецидивы заболевания – амелобластная фибросаркома, доброкачественный эпителиальный и злокачественный мезенхимальный компоненты

Последний рецидив – полное отсутствие эпителиального компонента, высокозлокачественная мелкокруглоклеточная саркома

BRAF V600E

И, таки, да... Пока ждали таргеты коллеги-педиатры не удержались от очередной попытки...

Карбоплатин 600 мг/м²,
Этопозид 600 мг/м²

Смешанные чувства – мы нашли, но это же...

- Совсем не доказательно и не системно...
 - Другой возраст
 - Другая (неизвестная науке) болезнь
 - Другая линия
- Все другое, но внутреннее ощущение, что надо!

Но игра стоила свеч! Абсолютно!

Эффект от проводимой терапии отмечен уже на 2-е сутки

На 25 сутки таргентной терапии

ДО начала терапии

- МРТ - уменьшение размеров опухолевого очага до 34 x 27 x 50 мм (уменьшение на 79%). Деформация и сужение ротоглотки также значительно уменьшились

Последующая хирургия сделала абсолютно паллиативную ситуацию излечимой, но она была бы невозможна, если бы мы не подумали о поиске мишени

Спустя 6 месяцев от начала таргетной терапии на фоне сохраняющегося выраженного эффекта очередное хирургическое лечение
Вид операционного поля после удаления опухоли

1. Латеральное основание черепа
2. Ротоглотка
3. Корень языка
4. Край слизистой ротоглотки
5. Заднее брюшко двубрюшной Мышцы
6. Внутренняя яремная вена

Один дополнительный тест и совсем другие надежды...

- Полный патоморфологический и (возможно) молекулярный ответ в удаленной опухоли
- Адьювантная терапия BRAF/МЕК до года суммарно
- **ПАЦИЕНТ ЖИВ, НО НЕ ПРОСТО ЖИВ**
 - В ремиссии с момента начала таргетной терапии с марта 2018 3 года
 - В полной хирургической ремиссии с сентября 2018 >2,5 лет
 - Без лечения после прекращения адьювантной с августа 2019 >1,5 лет

Похоже, мы, наконец, можем вычеркнуть слово «потенциально» из заголовка нашей статьи и жизни нашего пациента...

case reports

Potentially Curative Targeted Therapy for Undifferentiated High-Grade Sarcoma Developing After Malignant Transformation of a *BRAF* V600E–Mutated Ameloblastic Fibroma

Nikolay Zhukov, MD, PhD^{1,2}; Yulia Mareeva, MD¹; Dmitry Kononov, MD¹; Alexander Druy, MD, PhD¹; Nikolay Grachev, MD, PhD¹; and Dmitry Litvinov, MD¹

INTRODUCTION

Ameloblastic fibroma (AF) is a rare benign odontogenic tumor, consisting of odontogenic epithelium and mesenchymal tissues. Most AFs can be cured by radical enucleation or wide excision, but some tumors are initially unresectable or become unresectable after relapse because of locally invasive behavior or malignant transformation to ameloblastic fibrosarcoma (AFS).^{1,2} Currently, there are no established curative or even effective palliative treatments for unresectable AF or its malignant derivatives. Chemotherapy and radiotherapy are minimally effective, and new systemic treatment options are highly anticipated

revealed the malignant transformation of AF into AFS. The tumor retained its biphasic morphology, but the cytologically benign epithelial component was covered by highly mitotic atypical mesenchymal tissue (Figs 1C and 1D). Because the tumor was borderline resectable, the patient had experienced multiple recurrences, and malignant transformation of the tumor had been confirmed; aggressive soft tissue sarcoma-oriented chemotherapy aimed at tumor shrinkage was administered. The patient received three lines of neoadjuvant chemotherapy. First-line therapy with doxorubicin and high-dose ifosfamide resulted in 40% tumor regression. Disease remained stable after

Чтобы не забылось с чего начинали...

- Агрессивная мягкотканная саркома (на момент последней трансформации)
- 5 рецидивов опухоли
- 4 линии агрессивной химиотерапии без эффекта
- Лучевая терапия

И благодаря «всего лишь» диагностическому тесту мы это вылечили...

Лечение редчайших сарком.

Правда, замечательное название?

Терапия без доказательств и финансового обеспечения.

Treating the rarer sarcomas

**Offering treatment
without evidence
and financial coverage**

FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI

Silvia Stacchiotti
silvia.stacchiotti@istitutotumori.mi.it

Хотя, не совсем так...

- Страховые компании с «онкологической страховкой» уже готовы предоставлять финансовое обеспечение для подобных ситуаций
- Обсуждается вопрос о включении тестирования на редкие мишени в клинические рекомендации/стандарты
- Многие пациенты «дошедшие» до предела доступной стандартной терапии в абсолютно сохранном виде готовы искать шанс на продление жизни
- ...

А что у нас с редкими опухолями, о которых почти ничего не известно, в онкогинекологии? Да сколько угодно!

Printed by Nikolay Zhukov on 5/13/2021 12:09:24 PM. For personal use only. Not approved for distribution. Copyright © 2021 National Comprehensive Cancer Network, Inc., All Rights Reserved.

National
Comprehensive
Cancer
Network®

NCCN Guidelines Version 1.2021 Ovarian Cancer

[NCCN Guidelines Index](#)
[Table of Contents](#)
[Discussion](#)

[NCCN Ovarian Cancer Panel Members](#)
[Summary of the Guidelines Updates](#)

Epithelial Ovarian Cancer/Fallopian Tube Cancer/Primary Peritoneal Cancer:

[Clinical Presentation, Workup, Clinical Stage, Primary Treatment \(OV-1\)](#)
[Poor Surgical Candidate or Low Likelihood of Optimal Cytoreduction \(OV-2\)](#)
[Diagnosis by Previous Surgery: Findings and Primary Treatment \(OV-3\)](#)
[Pathologic Staging, Primary Chemotherapy/Primary Adjuvant Therapy \(OV-4\)](#)
[Post-Primary Treatment: Maintenance Therapy \(OV-5\)](#)
[Monitoring/Follow-Up, Recurrent Disease \(OV-6\)](#)
[Disease Status, Therapy for Persistent Disease or Recurrence \(OV-7\)](#)

Less Common Ovarian Cancers:

[Diagnosis \(LCOC-1\)](#)
[Carcinosarcoma \(Malignant Mixed Müllerian Tumors\) \(LCOC-2\)](#)
[Clear Cell Carcinoma of the Ovary \(LCOC-3\)](#)
[Mucinous Carcinoma of the Ovary \(LCOC-4\)](#)
[Grade 1 Endometrioid Carcinoma \(LCOC-5\)](#)
[Low-Grade Serous Carcinoma \(LCOC-6\)](#)
[Ovarian Borderline Epithelial Tumors \(Low Malignant Potential\) \(LCOC-7\)](#)
[Malignant Sex Cord-Stromal Tumors \(LCOC-10\)](#)
[Malignant Germ Cell Tumors \(LCOC-11\)](#)

- [Systemic Therapy Regimens - Malignant Germ Cell/Sex Cord-Stromal Tumors \(LCOC-A\)](#)
- [Surveillance - Malignant Germ Cell/Sex Cord-Stromal Tumors \(LCOC-B\)](#)

[Principles of Surgery \(OV-A\)](#)
[Principles of Pathology \(OV-B\)](#)
[Principles of Systemic Therapy \(OV-C\)](#)
[Management of Drug Reactions \(OV-D\)](#)
[WHO Histologic Classification \(OV-E\)](#)
[Staging \(ST-1\)](#)

Clinical Trials: NCCN believes that the best management for any patient with cancer is in a clinical trial. Participation in clinical trials is especially encouraged.

To find clinical trials online at NCCN Member Institutions, [click here: nccn.org/clinical_trials/member_institutions.aspx](#).

NCCN Categories of Evidence and Consensus: All recommendations are category 2A unless otherwise indicated.

See [NCCN Categories of Evidence and Consensus](#).

NCCN Categories of Preference: All recommendations are considered appropriate.

See [NCCN Categories of Preference](#).

Да, нет однозначных доказательств... Да, нет рекомендаций... Но есть очень обоснованные предположения, что мишень иногда важнее морфологии

RosOncoWeb

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА КЛИНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИИ
23 ГОДА (1997-2020) ТОЛЬКО ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В ОНКОЛОГИИ

Найти

- Об обществе
- Мероприятия
- Рабочие группы
- Газета
- Журнал
- Общественная деятельность
- Контакты

Медицинским специалистам:

- ▶ Архив выступлений и публикаций
- ▶ Практические рекомендации
- ▶ Клинические исследования
- ▶ Обучение по химиотерапии
- ▶ Врач и закон
- ▶ Онкологические ресурсы в сети
- ▶ Гранты и конкурсы
- ▶ Библиотека

Онкологам в период COVID-19

Новости онкологии

24.08.2020

MSI, TMB, NTRK – терапия, не учитывающая морфологию (disease-agnostic therapy). А почему не BRAF, ALK, PDGFR и т.д.?

Жуков Николай Владимирович
Руководитель отдела междисциплинарной онкологии
ФГБУ «НМИЦ Детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д.Рогачева»,
доцент кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук,
Москва

Как мы уже писали, эволюция противоопухолевой терапии происходит не только на уровне появления новых препаратов или групп препаратов, но и идеологически, понятийно. Следом (но не на смену, т.к. эти виды лечения продолжают существовать параллельно) за эмпирической химиотерапией пришла таргетная терапия, следом за таргетной – иммунотерапия, потом появилась терапия, независимая от типа опухоли (disease-agnostic therapy), сейчас, возможно, мы стоим на пороге «завершения цикла» и появления независимой от типа опухоли таргетной

И, к счастью, не только у меня!

editorials

ALK-Directed Therapy in Non-NSCLC Malignancies: Are We Ready?

Sabrina K. Salgia, MSc¹; Ameish Govindarajan, MD¹; Ravi Salgia, MD, PhD¹; and Sumanta K. Pal, MD¹

The impact of anaplastic lymphoma kinase (ALK)-directed therapies on non-small-cell lung cancer (NSCLC) has been transformative. The targeting of this subset, comprising just 4% of cases, might have at first seemed daunting since the initial approval of crizotinib for this multiple second- and third-generation ALK inhibitors have emerged, including ceritinib, alectinib, and lorlatinib.¹ With the success of lung cancer investigators in targeting first epidermal growth factor receptor mutations and then ALK translocation in the lung cancer community has been emboldened to tackle even rarer entities such as *ROS1*, *NTRK*, *BRAF*, and *HER2* alterations, each representing 2% or less of patients with NSCLC. Even a small benefit from targeted therapy, specifically *KRAS*^{G12C} mutations.²

original reports abstract

TARGETED DRUG THERAPY

Impact of ALK Inhibitors in Patients With ALK-Rearranged Nonlung Solid Tumors

Yuki Takeyasu, MD^{1,2}; Hitomi S. Okuma, MD, PhD^{1,3}; Yuki Kojima, MD, PhD¹; Tadaaki Nishikawa, MD, PhD¹; Maki Tanioka, MD, PhD¹; Kazuki Sudo, MD, PhD¹; Tatsunori Shimoi, MD, PhD¹; Emi Noguchi, MD, PhD¹; Ayumu Arakawa, MD, PhD¹; Taisuke Mori, MD, PhD¹; Kuniko Sunami, MD, PhD⁶; Takashi Kubo, PhD^{7,8}; Takashi Kohno, PhD^{7,9}; Yoshida Akihiko, MD, PhD^{4,10}; Noboru Yamamoto, MD, PhD¹¹; and Kan Yonemori, MD, PhD¹

PURPOSE Anaplastic lymphoma kinase (*ALK*) rearrangement is a well-known driver oncogene in non-small-cell lung cancer and has also been identified in other types of tumors. However, there is limited evidence on the clinical response to ALK tyrosine kinase inhibitors (TKIs), such as alectinib and crizotinib, in rare tumors with *ALK* fusion. We evaluated the therapeutic effect of ALK-TKIs in rare *ALK*-rearranged tumors.

PATIENTS AND METHODS Between April 2012 and April 2019, clinical outcomes and characteristics of patients with *ALK*-rearranged nonlung solid tumors who received ALK-TKIs (alectinib and/or crizotinib) outside of clinical trials were reviewed. Expression and/or rearrangement of ALK was evaluated by immunohistochemistry, fluorescence in situ hybridization, and next-generation sequencing. The tumor response was assessed according to RECIST (version 1.1). Progression-free survival was estimated from initial ALK-TKI initiation until progression.

RESULTS We identified seven patients (inflammatory myofibroblastic tumors, n = 3; ALK-positive histiocytosis, n = 1; histiocytic sarcoma, n = 1; osteosarcoma, n = 1; and parotid adenocarcinoma, n = 1), with a median age of 17 years. Two rare *ALK* fusions, namely, *CTNNA1-ALK* and *ITSN2-ALK*, were identified. As initial ALK-TKI therapy, five patients received alectinib and two received crizotinib. The objective response rate for the initial ALK-TKI therapy was 85.7% (95% CI, 44 to 97), including two patients who received alectinib and achieved complete response. The median progression-free survival was 8.1 months (range, 1.7 to not estimable). There were no treatment interruptions or dose reductions because of adverse events caused by alectinib.

CONCLUSION This study highlights the potential benefit of ALK-TKIs, especially alectinib, in patients with *ALK*-rearranged nonlung solid tumors.

case reports

Clinical Responses to Crizotinib, Alectinib, and Lorlatinib in a Metastatic Colorectal Carcinoma Patient With ALK Gene Rearrangement: A Case Report

Xi He, MD¹; Xiao-Dong Jiao, MD¹; Ke Liu, MD¹; Bao-Dong Qin, MD, PhD¹; Ying Wu, MD¹; Yan Ling, MD¹; Jun Liu, MD¹; A-Qiao Xu, MD²; Kun Song, MD²; and Yuan-Sheng Zang, MD, PhD¹

The highest incidence of ALK rearrangement in colorectal carcinoma (CRC) was reported in a patient with ALK rearrangement. This case report describes the clinical responses to crizotinib, alectinib, and lorlatinib in a patient with ALK rearrangement.

tumor response to crizotinib, alectinib, and lorlatinib therapy.

CASE REPORT

A 70-year-old female arrived at our clinic with abdominal pain present for 3 months. A computed tomography scan revealed a mass in the ascending colon accompanied by liver, peritoneum, and pleura metastases. Serum tumor markers including carcinoembryonic antigen (CEA), carbohydrate antigen (CA) 125, and CA19-9 significantly increased (Figs 1A and 1B). Colonoscopy pathology reported moderately to poorly differentiated adenocarcinoma (Fig 2A), and immunohistochemistry (IHC) demonstrated positivity for CK20 (Fig 2B). Formalin-fixed paraffin-embedded specimens from colonoscopy biopsy were subjected to NGS using the OncoScreen plus (Burning Rock Diagnostics, Irvine, CA) assay platform, including 520 cancer-

Чем шире мы тестируем, тем больше понимаем, что история тамоксифена, появившегося задолго до понятия «таргетная терапия», повторяется...

В наших руках гораздо больше disease-agnostic препаратов, просто они появились слишком рано...

Но чтобы назначить такую терапию и изменить судьбу больного нужно сначала найти мишень!

Если бы мы не нашли персонализированный подход к опухоли этого мальчика, то все бы закончилось еще в 2018 году...

...или редкий вариант известной мишени в известной опухоли...

Ложно-отрицательный ответ инициального теста Знали, что искали, но не нашли...

С помощью КГП можно обнаруживать перестройки ALK в подгруппе пациентов с НМРЛ с ранее отрицательными результатами ALK FISH

36 KGP: комплексное геномное профилирование; FISH: флуоресцентная гибридизация in situ; НМРЛ: немелкоклеточный рак легкого; AL, S.M., et al. (2018) The Oncologist 23:762-773.

FOUNDATION MEDICINE®

Roche

С помощью КГП можно обнаруживать перестройки ALK в подгруппе пациентов с НМРЛ с ранее отрицательными результатами ALK FISH

37 KGP: комплексное геномное профилирование; FISH: флуоресцентная гибридизация in situ; НМРЛ: немелкоклеточный рак легкого; AL, S.M., et al. (2018) The Oncologist 23:762-773.

FOUNDATION MEDICINE®

Roche

11 из 47 больных с наличием ALK-мутации по результатам комплексного геномного профилирования (КГП) имели «отрицательный» результат предыдущего тестирования другим методом
Для 7 из 11 терапия, направленная на выявленную мишень оказалась успешной (достигнута ремиссия)

Мы, увы, живем не в центре мира, где кипит научная жизнь...
Редкие варианты известных мишеней, обусловленные этническими особенностями

- Нет национальной системы умножения

НО

- Есть национальные особенности опухолей (и, возможно, их лечения)

REVIEWS

Hereditary Breast-Ovarian Cancer Syndrome in Russia

A. P. Sokolenko^{1,2}, A. G. Iyevleva^{1,2}, N. V. Mitiushkina¹, E. N. Suspitsin^{1,2}, E. V. Preobrazhenskaya¹, E. Sh. Kuligina¹, D. A. Voskresenskiy², O. S. Lobeiko¹, N. Yu. Krylova¹, T. V. Gorodnova¹, K. G. Buslov², E. M. Bit-Sava¹, G. D. Dolmatov⁴, N. V. Porhanova⁵, I. S. Polyakov⁵, S. N. Abysheva¹, A. S. Katanugina¹, D. V. Baholdin¹, G. A. Yanus^{1,2}, A. V. Togo¹, V. M. Moiseyenko^{1,3}, S. Ya. Maximov¹, V. F. Semiglazov¹, E. N. Imyanitov^{1,2,3*}

¹Petrov Institute of Oncology, St. Petersburg

²State Pediatric Medical Academy, St. Petersburg

³Medical Academy for Postgraduate Studies, St. Petersburg

⁴City Oncological Hospital, St. Petersburg

⁵Kuban State Medical University, Krasnodar

*E-mail: evgeny@imyanitov.spb.ru

Received 20.09.2010

Copyright © 2010 Park-media, Ltd. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

ABSTRACT Hereditary breast-ovarian cancer syndrome contributes to as much as 5–7% of breast cancer (BC) and 10–15% of ovarian cancer (OC) incidence. Mutations in the “canonical” genes *BRCA1* and *BRCA2* occur in 20–30% of affected pedigrees. In addition to *BRCA1* and *BRCA2* mutations, germ-line lesions in the *CHEK2*, *NBS1*, and *PALB2* genes also contribute to familial BC clustering. The epidemiology of hereditary breast-ovarian cancer in Russia has some specific features. The impact of the “founder” effect is surprisingly remarkable: a single mutation, *BRCA1* 5382insC, accounts for the vast majority of *BRCA1* defects across the country. In addition, there are two other recurrent *BRCA1* alleles: *BRCA1* 4153delA and *BRCA1* 185delAG. Besides *BRCA1*, in Russia breast cancer is often caused by germ-line alterations in the *CHEK2* and *NBS1* genes. In contrast to *BRCA1* and *BRCA2*, the *CHEK2* and *NBS1* heterozygosity does not significantly increase the OC risk. Several Russian breast

И обнаружение подобных генетических aberrаций иногда позволяет изменить жизнь многих людей одновременно

Sokolova et al. *Hereditary Cancer in Clinical Practice* (2021) 19:2
<https://doi.org/10.1186/s13053-020-00157-8>

Hereditary Cancer
in Clinical Practice

CASE REPORT

Open Access

Revisiting multiple erroneous genetic testing results and clinical misinterpretations in a patient with Li-Fraumeni syndrome: lessons for translational medicine

Tatiana N. Sokolova¹, Valeriy V. Breder², Irina S. Shumskaya³, Evgeny N. Suspitsin^{1,4}, Svetlana N. Aleksakhina¹, Grigoriy A. Yanus^{1,4}, Vladislav I. Tiurin^{1,4}, Alexandr O. Ivantsov^{1,4}, Barbara Vona⁵, Grigoriy A. Raskin⁶, Sergey V. Gamajunov³ and Evgeny N. Imyanitov^{1,4*}

Fig. 1 Pedigree of the patient described in this study

March: left lung upper lobectomy (lung tumor #1)

March: *EGFR* and *ALK* tested negative for lung tumor #1 (local pathology laboratory)

April: right mastectomy (breast tumor #1); biopsy for contralateral breast lump
May-November: neoadjuvant therapy

November: NGS for 59 hereditary cancer genes revealed germ-line *MSH6* c.2633T>C (p.V878A) (regional genetic service)

April - October: new lump in the left lung (lung tumor #2)

June: germ-line *MSH6* c.2633T>C (p.V878A) confirmed (cancer center)
July: germ-line *TP53* c.322_327del (p.G108_F109del) mutation detected (clinical genetic center)

December: left lung lower lobectomy (lung tumor #2)

May: new lumps in the lung

May: breast tumor #1 and lung tumor #2 showed loss of *MSH6* expression (IHC); no actionable mutations in *EGFR*, *ALK*, *ROS1* found in the lung tumor #2 (local pathology laboratory)

August: pembrolizumab monotherapy

January: pembrolizumab + pemetrexed + cisplatin

January: Foundation Medicine genomic profiling for lung tumor #2 revealed combination of *EGFR* (G719S and L833V) and *TP53* c.322_327del (p.G108_F109del) mutations

May 2020: consideration of clinical data; DNA and IHC confirmatory tests; pedigree analysis: Li-Fraumeni syndrome diagnosis

Abstract

Background: Many cancer patients undergo sophisticated laboratory testing, which requires proper interpretation and interaction between different specialists.

Case presentation: We describe a patient with an extensive family history of cancer, who was diagnosed with bilateral breast cancer and two lung cancer lumps by the age of 40 years. She submitted a lung cancer specimen to a genetic profiling service, which reported the presence of the *EGFR* mutation (a combination of G719S and L833V substitutions) and the *TP53* c.322_327del (p.G108_F109del) mutation in the tumor tissue. Possible therapeutic options were discussed at a medical conference, where one of the discussants raised a concern that the identified *TP53* mutation may not necessarily be somatic, but reflect the germ-line status of the gene. Review of clinical records and follow-up dialog with the patient revealed, that she previously provided her blood for DNA analysis in two laboratories. The first laboratory utilized a custom NGS assay and did not detect the *TP53* mutation, instead pointed to a potential pathogenic significance of the *MSH6* c.2633T > C (p.V878A) allele. The second laboratory revealed the *TP53* c.322_327del (p.G108_F109del) allele but stated in the written report that it has an unknown pathogenic significance. To resolve the possible uncertainty regarding the role of the *TP53* c.322_327del (p.G108_F109del) variant, we suggested that the patient invite her second cousin for genetic testing, as she was affected by neuroblastoma at the age of 3 years. This analysis revealed the presence of the same *TP53* variant.

Conclusion: We provide point-by-point discussion, reviewing multiple laboratory mistakes and clinical misinterpretations occurred with this patient. This case report exemplifies the need to involve rigorous clinical expertise in the daily practice of medical laboratory facilities.

Keywords: Li-Fraumeni syndrome, Breast cancer, Lung cancer, *TP53*

Один тест... И несколько ответов, кардинально меняющих ситуацию, развивавшуюся почти 4 года

- Исключение
 - Ложно-положительных
 - Ложно-отрицательных
- Обнаружение
 - Драйверной мутации, меняющей судьбу конкретной больной
 - Герминальной мутации, меняющей судьбу ее кровных родственников
 - Нового вида герминальной мутации, меняющей судьбу других пациентов

FOUNDATIONONE® CDx ПАЦИЕНТ 1900017945, Россия ТИП ОПУХОЛИ Аденокарцинома легкого ДАТА ОТЧЕТА 13 января 2020 года
об анализе: FoundationOne® CDx — это метод на основе секвенирования следующего поколения (next-generation sequencing, NGS), позволяющий идентифицировать генетические находки в сотнях генов, связанных с онкологическими заболеваниями. КОД СТРАНЫ Россия (RU) PPF# 514284

ПАЦИЕНТ
ЗАБОЛЕВАНИЕ: аденокарцинома легкого
ИМЯ: 1900017945, Россия
ДАТА РОЖДЕНИЯ: 9 июня 1978 года
ПОЛ: женский
НОМЕР ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ: не указан

ВРАЧ
НАПРАВИВШИЙ ВРАЧ
МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЛУЧАТЕЛЬ
НОМЕР МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ПАТОЛОГОАНАТОМ

ОБРАЗЕЦ
ОБЛАСТЬ ВЗЯТИЯ ОБРАЗЦА: легкое
НОМЕР ОБРАЗЦА: 4442/40*
ТИП ОБРАЗЦА: блок
ДАТА ВЗЯТИЯ: 1 декабря 2018 года
ОБРАЗЕЦ ПОЛУЧЕН: 16 декабря 2019 года

Геномные сигнатуры
Микросателлитный статус — стабильность (MS-Stable)
Мутационная нагрузка опухоли — 5 мут/Мб

Генные мутации
Полный список проанализированных генов содержится в Приложении.
EGFR — G719S, L833V
CCNE1 — амплификация
CDC73 — инверсия экзона 3
RAD21 — амплификация
TP53 — G108_F109del
7 значимых для заболевания гена без сообщенных мутаций: **KRAS, ALK, BRAF, MET, RET, ERBB2, ROS1**

5 препаратов одобрены в ЕС 10 клинических исследований
0 препаратов с отсутствием ответа

ГЕНОМНЫЕ СИГНАТУРЫ
Микросателлитный статус — стабильность (MS-Stable)
Мутационная нагрузка опухоли — 5 мут/Мб

ПРИМЕНИМОСТЬ НА ПРАКТИКЕ
Отсутствует терапия или клинические исследования.
См. Раздел, посвященный геномным сигнатурам.
Отсутствует терапия или клинические исследования.
См. Раздел, посвященный геномным сигнатурам.

ГЕННЫЕ МУТАЦИИ
EGFR — G719S, L833V

ТЕРАПИЯ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ В ЕС (ДЛЯ ТИПА ОПУХОЛИ ДАННОГО ПАЦИЕНТА)	ТЕРАПИЯ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ В ЕС (ДЛЯ ДРУГИХ ТИПОВ ОПУХОЛЕЙ)
Афатиниб	Нет
Дакомитиниб	
Эрлотиниб	
Гефитиниб	
Осимертиниб	

10 исследований, см. стр 14

Категория NCCN (категория NCCN может не отражать резистентность)

Да, есть абсолютно «пустые» ситуации (где мишеней действительно нет), но часто дело в инструменте!

Какой вариант выбрать для поиска? Готовы ли мы делать отдельный тест на каждую из потенциальных мишеней?

Доступные варианты выявления мишеней

Стандартный молекулярный тест на один маркер
Наиболее распространенный тип молекулярного тестирования

Иллюстрация от Foundation Medicine, основанная на информации из публикации: <https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR121001>

Мультигенный тест «hot spot»
Более полное тестирование, сосредоточенное на узком кластере генов

Иллюстрация от Foundation Medicine, основанная на информации из публикации: <https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR121001>

Комплексное геномное профилирование (CGP)
Более глубокая и четкая картина отдельной опухоли

Иллюстрация от Foundation Medicine, основанная на информации из публикации: <https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR121001>

Можем ли мы искать все возможные мишени, для которых «сварены» эффективные препараты во всех опухолях?

- У кого я однозначно буду искать мишени методом КГП при доступности
 - Опухоли с большим ожидаемым спектром мишеней при дефиците времени/образца опухолевой ткани для последовательного тестирования на индивидуальные маркеры
 - Пациенты с ожидаемым наличием мишени, но она не найдена
 - Пациенты с редкими опухолями
 - Пациенты с нетипичным течением заболевания
 - Больные, исчерпавшие (или близкие к этому) все стандартные варианты терапии, но находящиеся в хорошем общем состоянии
 - ...

К чему мы пришли в итоге?

НВ

Foundation Medicine превращает генетическую информацию в знания, имеющие практическую ценность

Метод комплексного геномного профилирования (КГП) ^{1,2}

1.

NGS (секвенирование следующего поколения) методом гибридного захвата выявляет в образце все клинически значимые генетические изменения

2.

Структурирование и анализ данных позволяет превратить результаты NGS в практические знания

3.

Научная/клиническая экспертная оценка для оказания дополнительной помощи в принятии клинических решений

4.

Отчет содержит информацию о геномных изменениях в опухоли конкретного пациента, включая TMB, MSI, PD-L1 с указанием возможных персональных терапевтических подходов и вариантов таргетного лечения

Персонализированная медицина требует нового подхода к клинической диагностике

CGP: комплексное геномное профилирование; NGS, next-generation sequencing: секвенирование следующего поколения; MSI: микросателлитная нестабильности TMB: мутационная нагрузка опухоли
 1. Foundation Medicine® (2018) <https://www.foundationmedicine.com/> (Accessed Feb 2018);
 2. FoundationOne® Technical Specifications (2017) Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one (Accessed June 2018); 3. Rozenblum, AB., et al. (2017) *J Thorac Oncol* 12:258-68;
 4. Schwaederle, M., et al. (2016) *Mol Cancer Ther* 15:743-52; 5. Wheeler, JJ., et al. (2016) *Cancer Res* 76:3690-701;
 6. Dhir, M., et al. (2017) *Cancer medicine* 6:195-206.

Комплексное геномное профилирование

За период 2018 - конец марта 2021 было проведено более 500 тестов FoundationOne®, из которых диагностика солидных опухолей составила 92,5%, сарком – 6,5%, онкогематологических заболеваний – 1%.

Поиск более 300 потенциальных мишеней для направленной терапии по одному образцу ткани или крови

FOUNDATIONONE® CDx ПАЦИЕНТ: 1900017945, Россия ТИП ОПУХОЛИ: Аденокарцинома легкого ДАТА ОТЧЕТА: 13 января 2020 года
Об анализе: FoundationOne® CDx — это метод на основе секвенирования следующего поколения (next-generation sequencing, NGS), позволяющий идентифицировать геномные находки в сотнях генов, связанных с онкологическими заболеваниями. КОД СТРАНЫ: Россия (RU) PFG#: 514284

ПАЦИЕНТ

ЗАБОЛЕВАНИЕ: аденокарцинома легкого
 IMR: 1900017945, Россия
 ДАТА РОЖДЕНИЯ: 9 июня 1978 года
 ПОЛ: женский
 НОМЕР ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ: не указан

ВРАЧ

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ВРАЧ
 МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЛУЧАТЕЛЬ
 НОМЕР МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
 ПАТОЛОГОАТОМ

ОБРАЗЕЦ

ОБЛАСТЬ ВЗЯТИЯ ОБРАЗЦА: легкое
 НОМЕР ОБРАЗЦА: 4442/40*
 ТИП ОБРАЗЦА: блок
 ДАТА ВЗЯТИЯ: 1 декабря 2018 года
 ОБРАЗЕЦ ПОЛУЧЕН: 16 декабря 2019 года

Геномные сигнатуры

Микросателлитный статус — стабильность (MS-Stable)
Мутационная нагрузка опухоли — 5 мут/Мб

Генные мутации

Полный список проанализированных генов содержится в Приложении.

EGFR — G719S, L833V
CCNE1 — амплификация
CDC73 — инверсия экзона 3
RAD21 — амплификация
TP53 — G108, F109del

7 значимых для заболевания генов без сообщенных мутаций: **KRAS, ALK, BRAF, MET, RET, ERBB2, ROS1**

5 препаратов одобрены в ЕС
 0 препаратов с отсутствием ответа

10 клинических исследований

ГЕНОМНЫЕ СИГНАТУРЫ

Микросателлитный статус — стабильность (MS-Stable)

Мутационная нагрузка опухоли — 5 мут/Мб

ГЕННЫЕ МУТАЦИИ

EGFR — G719S, L833V

10 исследований, см. стр 14

ПРИМЕНИМОСТЬ НА ПРАКТИКЕ

Отсутствует терапия или клинические исследования.
 См. Раздел, посвященный геномным сигнатурам.

Отсутствует терапия или клинические исследования.
 См. Раздел, посвященный геномным сигнатурам.

ТЕРАПИЯ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ В ЕС (ДЛЯ ТИПА ОПУХОЛИ ДАННОГО ПАЦИЕНТА)

Афатиниб	1
Дакомитиниб	1
Эрлотиниб	1
Гефитиниб	1
Осимертиниб	1

ТЕРАПИЯ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ В ЕС (ДЛЯ ДРУГИХ ТИПОВ ОПУХОЛЕЙ)

Нет

По результатам

- В общей популяции
 - 57,3% пациентов получили возможность назначения терапии, которая может улучшать клинические исходы по сравнению с эмпирическим лечением
 - По зарегистрированным показаниям
 - Мишени, имеющие зарегистрированные показания при других заболеваниях
 - Мишени, предполагающие большую чувствительность к терапии, но не одобренные официально в качестве предсказательных тестов
 - С учетом информации об идущих клинических исследованиях незарегистрированных препаратов, куда могут быть включены пациенты без терапевтических опций, доля пациентов, имеющих возможность получить направленную терапию составила 70%.
- Онкогинекологическая патология и РМЖ по отчетам с 2020 (n=27)
 - Выявление потенциальных терапевтических опций - 23 (85%)

Основной принцип в нашем несовершенном виде

Это то, что мы можем поменять уже сейчас

„Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого.“ — Фридрих Кристоф Этингер

<https://ru.citaty.net/tsitaty/636795-fridrikh-kristof-etinge-gospodi-dai-mne-spokoistvie-priniat-to-chego-ia-ne/>

Может ли лабораторный тест повлиять на судьбу больного?

Да, есть рекомендации и тесты, которые «перекрывают» наиболее типичные ситуации

Мы получили клинические рекомендации и стандарты лечения!

Правда, почему-то при одном и том же наборе доказательств они разные...

Но есть еще огромный и пока не формализованный объем клинически и научно значимых знаний и информации

И зачастую **ГРАМОТНЫЙ И ОПЫТНЫЙ** онколог и есть тот самый вариант индивидуализированного подхода в онкологии, пока доступной в настоящее время

Голосование ногами...

Рядом с чьим кабинетом мы видим очередь страждущих (при возможности выбора)?

К кому из коллег Вы отправите родственника или знакомого?

К специалисту с наибольшей частотой удачных индивидуальных решений о тактике лечения