Комбинированная хирургия глаукомы и катаракты с фемтолазерным этапом. Фармакологическое сопровождение (памяти учителям, профессорам С.Н. Федорову и В.И. Козлову посвящается)

Анисимова Светлана Юрьевна,
д.м.н.. профессор, Глазной
Центр «Восток- Прозрение» ,
Москва

лекция при поддержке ООО «Бауш Health»

Факоэмульсификация с фемто-лазерным сопровождением

- Предлагает хирургам эффективную неинвазивную технику для замещения некоторых ответственных этапов в стандартной хирургии катаракты.
- Лазер управляемый компьютером, связанным с ОКТ выполняет роговичные парацентезы, капсулотомию, фрагментацию ядра
- Исключается необходимость в использовании лезвий
- Сокращается время эмульсификации ядра и энергии УЗ

Возможности фемто секундного лазера в хирургии катаракты (длительность импульсов 250-400 фс)

лазера Victus B&L в хирургии катаракты

Факоэмульсификация с фемтолазерным сопровождением

Вскрытие парацентезов,
удаление фрагментов
ядра

Фемто-этап

Параметры фемтолазера

Передняя капсулотомия:

Диаметр (μm) – 3800-5200

Энергия (nJ) - 5000 – 6000

Фемто фрагментация:

Радиальные резы – 4 – 8

Циркулярные резы – 0 – 4

Энергия (nJ) – 7.400 – 8.800

Новые технологии в фемтосекундной лазерной хирургии катаракты – 0% ультразвука

Figure 1. The Zero Phaco Handpiece, designed to work with the Stellaris system,

Moving Toward Zero Phaco

Using the Victus femtosecond laser can help to reduce or eliminate effective phaco time.

BY ERIK L. MERTENS, MD, FEBOPHTH

Сокращение или исключение
эффективного времени ФЭ -
движение к нулевому УЗ

Conrad-Hengerer, 2012,
Abell, 2013, Mertens, 2015.

Дробление ядра с помощью фемтолазера (ESCRS, 2019)

Laser beam multiplied by dynamic phase mask

Phase Mask Matrix obtained Energy Spread

Gemini EYE CLINIC

This slide illustrates the laser process. It features three panels: 'Phase Mask' showing a textured surface, 'Matrix obtained' showing a grid of small spots, and 'Energy Spread' showing a 3D plot of energy distribution. The Gemini Eye Clinic logo is at the bottom.

20 000 small cubes with 200 μ side created in 20 seconds

This slide shows a diagram of an eye with a lens being fragmented by a femtosecond laser. The text above the diagram states that 20,000 small cubes with a 200 micrometer side are created in 20 seconds.

First human lens fragmented by femtosecond laser

This slide shows an intraoperative photograph of a human lens being fragmented by a femtosecond laser. The lens is visible as a large, rounded, yellowish structure within the eye.

До **1/3** пациентов,
поступающих на
хирургию катаракты
имеют диагноз

глаукома ¹⁻³

1. Vieversyte M. et al. Prevalence of ocular comorbidity in eyes undergoing cataract surgery. Poster, presented at XXXV Congress of the European Society of Cataract and Refractive Surgeons (Lisbon, Portugal, 7-11.10.2017). [Электронный ресурс]. URL: www.es CRS.org/lisbon2017/programme/posters-details.asp?id=28768 (Дата обращения: 13.06.2018).
2. Pham TQ et al. Systemic and ocular comorbidity of cataract surgical patients in a western Sydney public hospital. Clin Exp Ophthalmol. 2004 Aug;32(4):383-7.
3. Liu Y et al. Ocular comorbidities among cataract-operated patients in rural China: the caring is hip Study of Cataract Outcomes and Uptake of Services (SCOUTS), report No. 3. Ophthalmology. 2007 Nov;114(11):e47-52.

Комбинированная хирургия глаукомы и катаракты

- Фако + трабекулэктомия
- Фако+антиглаукомные устройства
- Фако+ эндоциклокоагуляция
- ФАКО +MIGS (микроинвазивные устройства)
- НГСЭ комбинированная с хирургией катаракты дает такой же результат в нормализации ВГД, как и факотрабекулэктомия с таким же результатом в ОЗ, но значительно более редкими П/О осложнениями, что делает возможным ее проведение в амбулаторных условиях.
- **Techniques for Combined Cataract and Glaucoma Surgery. D. Moore, 2015.**
- **Combined surgery for cataract and glaucoma: phacoemulsification and deep sclerectomy compared with phacoemulsification and trabeculectomy. Gianoli F¹, Schnyder CC, Bovey E, Mermoud A. 2009**

4,5 года произведено 2500 ФЭ
с фемтосопровождением (фемтолазерная
установка Виктус, Валеант)

**Фемто+факоэмульсификация
+ антиглаукоматозная
операция –
НГСЭ+Ксенопласт**
Возраст от 42 - 89
n=189

**Фемто
+сублюксация катаракты
(имплантация
внутрикапсульного
кольца перед удалением
фрагментов)**
Возраст от 58 - 87
n=39

Плотность катаракты 4+ -
30%

Стелларис РС (Валеант)
–через основной разрез
1,8 мм,
2 вспомогательных 1,0 мм

За сутки до операции

- ▶ 1. Флоксал 3 р/д и 1 неделю п/о
- ▶ 2. НПВС (Индоколлир) – 2-3 р/д для поддержания мидриаза во время факоэмульсификации и после лазерного этапа.
- ▶ 3. Мах гипотензивная терапия fix комбинациями
- ▶ 5. Общие гипотензивные + дневные транквилизаторы (феназепам 0,001) (н/н и утром)

Перед операцией

- ▶ 1. Анестетики –
(3 раза с интервалом 15 мин)
- 2. Флоксал
- 3. Мидриатики
- ▶ - ирифрин 2,5% , тропикамид 0,5% 2 р/д
- ▶ 4. Нестероидные противовоспалительные (Индоколлир)
- ▶ 5. ИКА

индометацин 0,1%

ИНДОКОЛЛИР

Капли глазные 5 мл

- ✓ Ингибирование миоза во время хирургических вмешательств
- ✓ Профилактика воспалительных осложнений в послеоперационном периоде
- ✓ Уменьшение болевого синдрома «в области глаза» в послеоперационном периоде в первые сутки после операции
- ✓ Системная абсорбция при местном применении незначительна

BAUSCH + LOMB

Информация предоставлена для медицинских работников

Рег. уд.: П N015363/01 от 16.06.2009

индометацин 0,1%

ИНДОКОЛЛИР

Капли глазные 5 мл

Молекула
индометацина

Гидрофобная молекула
помещается
в гидрофобный «карман»
циклодекстрина

Циклодекстрины (вспомогательные вещества)

BAUSCH + LOMB

Информация предоставлена для медицинских работников

RUS-OPH-IND-11-2019-1402-updated

Узкий зрачок – 4,2 мм-тип диаметра капсулотомии 3,8 мм

Особенности роговичных разрезов с помощью ФЕМТО-лазера

Планирование профиля роговичного разреза с
Тремя плоскостями, с двумя и с одной плоскостью.

Пациент
видит луч
наводки

Комбинированная ФЭ с фемтосопровождением и НГСЭ с ДКА Ксенопласт

Измерение ВГД во время наложения вакуумного кольца

ВГД повышается на 8-14 мм рт.ст.

Шпатель для вскрытия фемто-парацентов

Фемтосекундно-лазерная передняя капсулотомия

- Флотирующий фрагмент
- Плотно прилегающий фрагмент
- Неполная капсулотомия
- Радиальные разрывы 0%

N=20 – набухающие катаракты

N=190

Минимизация осложнений **при набухающих катарактах...**

DOG 2014, ESCRS 2014 I. Conrad-Hengerer, F.H.Hengerer, T.Kohnen, T.Schultz, H.Burkhard Dick

Край передней капсулы – электронная микроскопия (увеличение 8000)

Фемто

Мануальный

Результаты измерения параметров ультразвука при ФЭ с фемто-лазерным сопровождением (ФЭФЛС) и стандартной ФЭ при комбинированной операции

Группы	ФЭФЛС	ФЭ- стандартная методика
Показатель	М±σ	М±σ
Мощность ультразвука (УЗ) (%)	8,1 ± 1,1	11,5 ± 2,1
Эффективное время УЗ (ЕРТ) (сек)	0,78 ± 0,55	1,37 ± 0,85
Время работы УЗ (сек)	9,8 ± 3,0	13,28 ± 4,1
Время интраокулярных манипуляций: (капсулорексис +факофрагментация+ удаление ядра) (мин)	0,70 ± 0,10	1,40 ± 0,18

Анисимова С. Ю., Анисимов С. И., Новак И. В., Полякова К. М., Анисимова Н. С.
 Сравнительная оценка клинических результатов стандартной факоэмульсификации и факоэмульсификации с фемтолазерным сопровождением в условиях амбулаторной клиники. Катарактальная и рефракционная хирургия 2013; 13(2):17-21.

Осложнения

- Разгерметизация фемто-разрезов – 0%
- Отслойка десцеметовой оболочки – 1 случай
- Термический ожог в области основного разреза – 2 случая (при плотности ядра 4+)
- Гипотония – 8 (1,8%) при комбинированном вмешательстве
- Щелевидная передняя камера или ее отсутствие – 0%

ОСТ во время ФЕМТО-этапа

С.Ю.Анисимова, С.И.Анисимов, И.В.Новак Факоэмульсификация катаракты с фемтолазерным сопровождением.Первый отечественный опыт.//Катарактальная и рефракционная хирургия.-2012-т.12-№3.-с.7-10.

Осложнения ФФЭ и ФЭ

	ФФЭ	ФЭ
Мостики Капсулотомии(глубокая орбита, узкая глазная щель)	2	-
Разрыв передней капсулы при факоемульсификации	9	7
Разрыв задней капсулы	1	2
Дислокация ядра или его фрагментов в стекловидное тело	0	0
Иридоциклит	3	5
Миоз во время ФЭ	5	3
Гифема	2	3

N=350 N=354

*Псевдоэксфолиативный синдром, подвывих хрусталика, катаракта+глаукома (НГСЭ или ГСЭ+ {ксенопласт коллагеновый дренаж), Травматическая катаракта, Твердость катаракты >4+, набухающая катаракта.

Осложнения специфические для Фемто-этапа

- Сужение зрачка – 11%
- Потеря вакуума во время фемто-этапа – незначительная проблема, так как полужидкий интерфейс аппарата Victus не требует значительного вакуума. Для проведения фемто-этапа необходимо несколько секунд вакуума.

Потеря вакуума возможно при беспокойном поведении пациента, узкой глазной щели

Имплантированные ИОЛ

Монофокальная
гидрофобная Эн Виста –
410 (в год)
Preloaded (Hoya) – 92
Гидрофильные (Акристайл
Трансконтакт, Россия) - 260

Торические ИОЛ (Acrysof, En Vista) - 52

Премиум ИОЛ

Мультифокальные (Tecnis –J-J, SeeLens, Hanita) - 62

Глистенинг ИОЛ - снижение зрения на 1-2 строчки,
снижение контрастной чувствительности-пациенты видят,
как с начальной катарактой

3 года после
имплантации

5 лет после имплантации – 80%
гидрофобных ИОЛ поражены
глистенингом

ИОЛ En Vista и En Vista Toric

- В ходе 3-х летнего проспективного исследования 350 глаз не было выявлено ни единого случая появления глистенинга
- Срок наблюдения 6 месяцев до 4 лет.
- Произведена факоэмульсификация с фемтолазерным сопровождением

После операции

- Достижение рефракции цели-92%
- Максимальная острота зрения
- Частота развития фиброза задней капсулы < 5%

Аберрометрия псевдофакичного глаза после Фемто-фако и стандартной ФЭ

ФЭФЛС+ИОЛ

ФЭ+ИОЛ

Децентрация ИОЛ- возникновение новых аббераций высокого порядка

Правильная центрация ИОЛ глазу
Достигается центрированным
фемтокапсулорексисом, а также
правильным положением
капсульного
мешка

НГСЭ+Дренаж Ксенопласт+Фемто+факоэмульсификация

ФФЭ+НГСЭ+Ксенопласт в сравнении с ФЭ+НГСЭ+Ксенопласт

IOP	ФЭ+НГСЭ+Ксенопласт N=21	ФФЭ+НГСЭ+Ксенопласт T N=80
Предоперационно	30,0 ± 5,1	26,4 ± 7,0
1й день п/о	29,8 ± 6,0	24,8 ± 5,1
1 месяц п/о	19,4 ± 2,0	16,4 ± 3,2

p<0.05

p>0.05

Транзиторная гипертензия – ИКА

Гониоскопия и ОСТ зоны операции с ДКА Ксенопласт

Состояние зоны фильтрации
после ИАГ-лазерной
гониопунктуры

Техника имплантации дренажа Ксенопласт в угол передней камеры при проведении трабекулэктомии

Пациентка Л.. 56 лет, ОУ III а оперированная глаукома
наблюдается в течение 30 лет (4 а/г операции ОУ)

Ксенопласт

6 месяцев после ГСЭ+Ксенопласт
дренаж на 6 часа по лимбу OD,
ВГД 10 мм рт.ст.

Ксенопласт

Осложнения после комбинированной операции (n=188 глаз).

Мелкая передняя камера наблюдалась при сочетании с проникающей антиглаукоматозной операцией – трабекулэктомией с имплантацией дренажа Ксенопласт в угол передней камеры) –

Лечение - введение когезивного вискоэластика в ПК на 1 сутки и до 3-х суток п/о - 8 случаев - 2.1%

ОСО – 2 случая, задняя трепанация склеры не понадобилась.

Отсутствие передней камеры глаза - 0

Дислокация дренажа – 0

ИАГ-лазерная гониопунктура в зоне НГСЭ трабекулокорнеальной мембраны ab interno (мощность ИАГ-лазера 6-8 мДж) при повышении ВГД до 20 мм рт.ст.

после НГСЭ проводилась в 20% случаев 1 -6 мес. п/о (при далекозашедшей глаукоме в 50% случаев)

Анисимова С.Ю., Анисимов С.И., Новак И.В., Арутюнян Л.Л., Загребельная Л.В., Полякова К.М. Комбинированная непроникающая глубокая склерэктомия и факоэмульсификация с фемтосопровождением у больных с катарактой и глаукомой// Национальный журнал глаукома.
- 2014.-т. 13.- № 3.-с.7-13.

Послеоперационное ведение после комбинированной операции

- Кортикостероидные препараты с 4 до 2 раз в день 2 недели п/о
- Индоколлин 4-3 раза в день до 2-х и более месяцев п/о
- - Оквис 2-4 раза в день, Артелак X 2 раза в день
- Корнерегель 2 раза в день до 1 месяца п/о

НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕПАРАТА КОРНЕРЕГЕЛЬ СПОСОБСТВУЕТ БОЛЕЕ РАННЕМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ РОГОВИЦЫ

Корнерегель также применялся в группе пациентов с первыми признаками повреждения глазной поверхности при синдроме сухого глаза:

- ✓ у более 80% пациентов указывали улучшение состояния в течение первых суток,
- ✓ эффект лечебных мероприятий сохранялся длительное время.

Кератопротективные Эффекты Декспантенола

ДЕКСПАНТЕНОЛ

ПАНТОТЕНОВАЯ КИСЛОТА (Витамин

Активация синтеза кортикостероидов

СЛАБОЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ

- **Уменьшает отек роговицы**
- Нормализует клеточный метаболизм и увеличивает прочность коллагеновых волокон

КОФЕРМЕНТ А (коэнзим А)

Цикл Кребса – аэробное дыхание клеток с формированием АТФ

РЕГЕНЕРАЦИЯ – ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТКАНЕЙ ГЛАЗНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

- **Активирует процессы регенерации тканей** роговицы и конъюнктивы
- **Сокращает сроки эпителизации:** ускоряет митоз и пролиферацию фибробластов

RUS-OPH-CRN-CRN-06-2019-1780

КАРБОМЕР - ГЕЛЕВАЯ ОСНОВА

Карбомер* (гелевая основа)

разработан специально для увеличения времени удержания активного вещества на роговице

1. Структура полимерной цепочки частично нарушается при моргании и из формы геля карбомер переходит в состояние жидкости:
 - Вязкость препарата уменьшается
2. После периода покоя первоначальная структура восстанавливается (тиксотропный эффект)
 - Вязкость препарата увеличивается
3. Цепь карбомера обладает биоадгезивными свойствами и длительно удерживается на поверхности глаза:
 - Обеспечивается постоянное увлажнение роговицы

Структура полимерного скелета карбомера

* - вспомогательный компонент в составе препарата Корнерегель

КОРНЕРЕГЕЛЬ: ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ СВОЙСТВ

Динамика остроты зрения П/О

Динамика ВГД после комбинированной операции НГСЭ+Ксенопласт+ФФЭ (1 неделя-6 месяцев)

Box Plot of ВГДрк grouped by сроки наблюдения
Spreadsheet1111.sta 58v*163c
Include cases: 1:90

Динамика ВГД после комбинированной операции НГСЭ+Ксенопласт+ФФЭ (1-4 года после операции)

Box Plot of ВГДрк grouped by сроки наблюдения
Spreadsheet1111.sta 58v*163c
Include cases: 91:123

Динамика коэффициента гистерезиса в отдаленном п/о периоде (1-4 года п/о)

Mean Plot of CH grouped by сроки наблюдения
Spreadsheet1111.sta 58v*163c
Include cases: 91:120

Спасибо за внимание !

Дренаж коллагеновый
антиглаукоматозный

Фемтолазерные технологии в офтальмохирургии