Подходы к лечению вагинитов у женщин репродуктивного возраста с позиции доказательной медицины и современных клинических рекомендаций

**РНИМУ им. Н.И.Пирогова
Кафедра акушерства и гинекологии п/ф
Доцент Евсеев А.А.**

ВАГИНАЛЬНО-ЦЕРВИКАЛЬНАЯ СРЕДА

Влагалище является динамической экосистемой, которая содержит около 10⁹ бактериальных колониеобразующих единиц

- Нормальные влагалищные выделения белого цвета, без запаха и обладают высокой вязкостью
- Нормальная бактериальная флора - преобладание лактобацилл
- Нормальная кислая среда (pH 3,8-4,5)
- Нормальное присутствие лейкоцитов (не более 10)

- В составе микробиоты присутствуют резидентные и транзиторные микроорганизмы
- Транзиторные микроорганизмы представлены облигатной и условно-патогенной микрофлорой

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ЛАКТОБАКТЕРИЙ И БИФИДОБАКТЕРИЙ

- высокая адгезия к влагалищным эпителиоцитам (препятствует адгезии патогенов, ограничивает излишнюю пролиферацию условно-патогенных бактерий влагалища);
- способность к кислотообразованию (рН 3,8-4,5);
- способность продуцировать эндобиотики, лизоцим, спирты, бактериоцины, перекись водорода (H_2O_2)

БИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА В НОРМЕ

ЧАСТОТА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ИНФЕКЦИЙ ПРИ СИНДРОМЕ ВАГИНАЛЬНЫХ ВЫДЕЛЕНИЙ

Пациентки с жалобами на патологические выделения, зуд, жжение являются самыми частыми посетителями гинеколога.

КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ

- ❖ бактериальный вагиноз
- ❖ кандидозный вульвовагинит
- ❖ трихомонадный вагинит
- ❖ аэробный вагинит
- ❖ другие инфекции

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ

Бактериальный вагиноз – инфекционный невоспалительный синдром, характеризующийся резким снижением или отсутствием лактофлоры и ее заменой на полимикробные ассоциации строгих анаэробов и гарднерелл.

Встречается в различных популяциях женщин от 16 до 65%, у 15–37% беременных, при патологических белях – до 87%.

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ

КРИТЕРИИ R. Amsel (1983)

1. Специфические вагинальные выделения
2. Выявление «ключевых клеток» в мазках
3. Положительный аминовый тест
4. pH влагалищного отделяемого > 4,5.

КРИТЕРИИ R. Nugent (1991) БВ 7-10 баллов

Баллы	A	Lactobacilli	B	Gardnerella	C	Mobiluncus
0	более 30 морфотипов		нет морфотипов		нет морфотипов	
1	5 - 30 морфотипов		один морфотип		1-4 морфотипа	
2	1-4 морфотипа		1-4 морфотипа		5 и более морфотипов	
3	один морфотип		5 - 30 морфотипов			
4	нет морфотипов		более 30 морфотипов			

Обнаружение только *G. vaginalis* и/или *Mobiluncus spp.* методом молекулярногенетического анализа не дает оснований для подтверждения диагноза БВ!

Кандидозный вагинит

- ✓ По данным ВОЗ вульвовагинальный кандидоз составляет 20 - 40% от всех инфекционных поражений вульвы и влагалища (в 24-45% сочетается с БВ).
- ✓ К 25 годам более чем половине современных женщин ставился диагноз ВВК.
- ✓ 75% женского населения имели хотя бы один эпизод ВВК, 50% - 2 и более эпизода, у 15-20% - 4 и более эпизода в год, 5% - каждые 2 месяца

При беременности ВВК – у 30-35%

CANDIDA

Возбудитель – грибы рода *Candida* (170 видов)

85% случаев возбудитель – *Candida albicans*

15% случаев возбудитель - *Candida glabrata*

Candida tropicalis

Candida parapsilosis

Не относится к ИППП

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ВВК

- Зуд, жжение во влагалище и в области наружных половых органов. Усиливаются после водных процедур, полового акта и во время сна.
- Творожистые выделения из половых путей.
- Диспареуния
- Дизурические расстройства.
- Нарушение качества жизни с наличием психотических расстройств

КАНДИДОЗНЫЙ ВАГИНИТ - ДИАГНОСТИКА

- ✓ Микроскопия вагинального мазка – почкующиеся клетки, **псевдомицелий** и споры дрожжеподобного грибка. Важен правильный сбор материала!
- ✓ Микроскопия нативного мазка после обработки 10% КОН
- ✓ Культуральный (посев влагалищного содержимого на искусственные питательные среды - среда Сабуро, рисовый агар) - при рецидивах, при подозрении на *C. nonalbicans*
- ✓ ДНК-диагностика (ПЦР) - **нет!**

ТРИХОМОНАДНЫЙ ВАГИНИТ

инфекционное заболевание мочеполовых органов, вызываемое *Trichomonas vaginalis* и передаваемое половым путем.

- Пенистые выделения из влагалища, признаки вагинита, уретрит, эрозивные поражения, петехиальные кровоизлияния («клубничная шейка»)
- **Диагностика затруднена** – необходима микроскопия нативного препарата или использование МАНК (ПЦР).
- Местная терапия малоэффективна
- **Необходимо системное лечение**

АЭРОБНЫЙ ВАГИНИТ

- Возбудители - стрептококки группы В, GABHS (group A beta-hemolytic streptococci), золотистый стафилококк, Enterococcus sp. и Escherichia coli
- Воспалительная реакция мазка
- Снижение лактобацилл

АЭРОБНЫЙ ВАГИНИТ

- Снижает качество жизни (особенно при десквамативном воспалении)
- Повышает риск гинекологических заболеваний (увеличение частоты тяжелых CIN шейки матки, ВЗОМТ, заражение ВИЧ и урогенитальными инфекциями)
- Отягощает репродуктивный прогноз
- Увеличивает риск акушерских осложнений

ДИАГНОСТИКА АЭРОБНОГО ВАГИНИТА

Микроскопия вагинального мазка

- вагинальный эпителий представлен поверхностными, промежуточными и парабазальными клетками
- лейкоцитарная реакция (более 10 лейкоцитов в поле зрения)
- отношение полиморфноядерных лейкоцитов к клеткам плоского эпителия более чем 1:1
- общее количество микроорганизмов умеренное
- лактобациллы отсутствуют или их количество снижено
- преобладают морфотипы условно-патогенных микроорганизмов (колимофные палочки или Гр+ кокки)

ДИАГНОСТИКА АЭРОБНОГО ВАГИНИТА

(G.G.G. DONDERS, A. VEREECKEN, E. BOSMANS, 2002)

Баллы АВ	(LBG)	Количество лейкоцитов	токсичные лейкоциты	Флора	парабазальные эпителиоциты
0	I и IIa	< 10	Нет	Нет или цитоллиз	Нет или <1%
1	IIb	>10 лейкоцитов и < 10 эпителиальных клеток	< 50% лейкоцитов	Немного колиформных бацилл	<10%
2	III	>10 лейкоцитов и 10 эпителиальных клеток	>50% лейкоцитов	кокки	> 10%

До 3 баллов – аэробного вагинита нет

3-4 балла – легкий аэробный вагинит

5-6 баллов – аэробный вагинит

Более 6 баллов - аэробный десквамативный эндокольпит

ВАГИНИТЫ – МИКСТ ИНФЕКЦИЯ

Аэробный вагинит может быть изолированным и сочетаться с

- Кандидозной инфекцией – 38%
- Анаэробной инфекцией – 37%
- Трихомонадной инфекцией – 25%

Это создает трудности диагностики!

Микст инфекция утяжеляет течение заболевания с возникновением частых рецидивов

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЛАГАЛИЩНОЙ МИКРОБИОТЫ

- У всех женщин с удачными исходами ЭКО во влагалище доминировали *Lactobacillus*
- *Anaerococcus, Acidovorax, Enterococcus, Escherichia, Finegoldia, Flavobacterium, Prevotella* и *Streptococcus* ассоциировались с неудачами ЭКО, несмотря на антимикробную профилактику
- Вагинальная микробиота на момент переноса эмбриона является важным фактором успеха ЭКО; наличие исключительно штаммов *Lactobacillus* наиболее благоприятно

Hyman RW, Herndon CN, [...], Giudice LC. The dynamics of the vaginal microbiome during infertility therapy with in vitro fertilization-embryo transfer J Assist Reprod Genetic 2013

БЕРЕМЕННОСТЬ И ВЛАГАЛИЩНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Бактериальный вагиноз и Аэробный вагинит

- до беременности снижает частоту зачатия и повышает риск самопроизвольного выкидыша
- в I триместре беременности увеличивает риск преждевременных родов
- в III триместре беременности увеличивает риск послеродовых осложнений

Карапетян Т.Э., и др. Аэробные вагиниты и беременность. *Акушерство и Гинекология* №4 / 2013

Donders GG. et al. Predictive value for preterm birth of abnormal vaginal flora, bacterial vaginosis and aerobic vaginitis during the first trimester of pregnancy or why metronidazole is not a good option in pregnancy // 6th European Conference ESIDOG / Abstract Book. — 2008. —

Plen II-2.

Carey J.C., Klebanoff M.A. Is a change in the vaginal flora associated with an increased risk of pre- term birth? // *Am. J. Obstet. Gynecol.* - 2005. - Vol.192, No 4. - P. 1341-1346.

Tibaldi C et al. Maternal risk factors for abnormal vaginal flora during pregnancy. *Int J Gynaecol Obstet.* 2016; 133(1): 89-93

КАК МЫ СТАВИМ ДИАГНОЗ ВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ?

- **Утверждение:** диагноз бактериального вагиноза устанавливается на основе критериев Амсея (патологические выделения, щелочная рН, аминный тест, «ключевые» клетки)
- **На практике –диагноз на «глазок»:**
 - Патологические выделения определяются субъективно
 - рН влагалищного содержимого не измеряется
 - Аминный тест никто не делает
 - «Ключевые» клетки в мазке – единственный объективный критерий

ДИАГНОЗ?

- Пациентка жалуется на обильные выделения с неприятным «рыбным» запахом.

Лейкоциты	(U)	(C)	(V)	R
Эпителии	0-1 в/ф	3-10 в/ф	30-100 в/ф	в/ф
Слизь			мелкозер.	
Гонококки	-	-	-	-
Ключевые клетки	мн.	редко?	редко!	
Дата				
		Врач-лаборант		

Вагинит!

БАГИНОЗ VS ВАГИНИТ

Основой для правильной оценки патологического состояния влагалища служит **наличие или отсутствия воспаления.**

Характер дисбиотических изменений вторичен.

При наличии воспаления, вызванного как аэробными, так и анаэробными микроорганизмами, вполне уместен диагноз аэробного (неспецифического) вагинита.

~~Бактериальный вагиноз с воспалительной реакцией
Вагинит на фоне бактериального вагиноза~~

Два типа нарушений баланса микрофлоры влагалища при снижении количества лактобактерий

Бактериальный вагиноз

Слабый цитокиновый ответ

- Умеренно IL-1
- Нет воспаления, нет лейкоцитов

Аэробный вагинит

Сильный цитокиновый ответ

- Высокий уровень IL-1, IL-6, IL-8
- Воспаление, токсичные лейкоциты

ДИАГНОСТИКА ВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ КОГДА?

- Наличие симптомов вагинальной инфекции (патологические выделения и/или симптомы воспаления) требует микробиологической диагностики
- При отсутствии симптомов рутинная диагностика на этапе прегравидарной подготовки, в I и III триместрах беременности, перед инвазивными гинекологическими манипуляциями должна проводиться с помощью рН-метрии: **уровень рН > 4,7** требует микробиологической диагностики
- (рН >4,5 отмечен у 87,5% пациенток с аэробным вагинитом)!

ХАРАКТЕР ВЫДЕЛЕНИЙ И pH ВАГИНАЛЬНОГО СОДЕРЖИМОГО

Возбудитель/ заболевание	Характер выделений	pH
Нормальная флора	Слизистые	4,0-4,5
Трихомонадный вагинит	Пенистые	5,0-6,0
Кандидозный вагинит	Творожистые	4,0-4,5
Бактериальный вагиноз	Серые, сливкообразные с неприятным запахом	> 4,5
Аэробный вагинит	Обильные желтые	> 6,5

ДИАГНОСТИКА ВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ КАК?

- Микроскопия влагалищного отделяемого с окраской по Граму
- Качественное исследование ПЦР – только для ИППП
- ПЦР в реальном времени (флороценоз, фемофлор)
- Культуральный метод применяется с исследовательской целью или для подтверждения/исключения кандидоза

Fan A, et al. Aerobic vaginitis and mixed infections: comparison of clinical and laboratory findings. Arch Gynecol Obstet.2013; 287(2): 329–335

Rumyantseva TA, Bellen G, Savochkina YA, Guschin AE, Donders GG. Diagnosis of aerobic vaginitis by quantitative real-time PCR. Arch Gynecol Obstet. 2016; 294(1): 109–114

№	Название исследования	Результаты	
		Количественный	Относительный Lg(X/CBMO)
	Контроль взятия материала	10 ^{4.5}	☒
1	Общая бактериальная масса	10 ^{5.9}	☐
НОРМОФЛОРА			
2	Lactobacillus spp.	10 ^{5.9}	0.0 (82-100%) ☒
ФАКУЛЬТАТИВНО-АНАЭРОБНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ			
3	сем. Enterobacteriaceae	не выявлено	☐
4	Streptococcus spp.	не выявлено	☐
5	Staphylococcus spp.	не выявлено	☐
ОБЛИГАТНО-АНАЭРОБНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ			
6	Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.	10 ^{4.0}	-1.9 (1.0-1.4%) ☒
7	Eubacterium spp.	10 ^{3.5}	-2.5 (0.3-0.4%) ☐
8	Sneathia spp.+Leptotrichia spp.+Fusobacterium spp.	не выявлено	☐
9	Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.	10 ^{4.0}	-2.0 (0.9-1.2%) ☒
10	Lachnobacterium spp.+Clostridium spp.	не выявлено	☐
11	Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp.	10 ^{3.9}	-2.1 (0.7-1.0%) ☐
12	Peptostreptococcus spp.	не выявлено	☐
13	Atopobium vaginae	не выявлено	☐
ДРОЖЖЕПОДОБНЫЕ ГРИБЫ			
14	Candida spp. *	не выявлено	☐
МИКОПЛАЗМЫ			
15	Mycoplasma hominis *	не выявлено	☐
16	Ureaplasma (urealyticum + parvum) *	не выявлено	☐
ПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ			
17	Mycoplasma genitalium **	не выявлено	☐

* Абсолютный анализ Lg(X)

** Качественный анализ

СКОЛЬКО И КАКИХ МИКРООРГАНИЗМОВ НУЖНО ВЫЯВЛЯТЬ?

Gardnerella vaginalis, *Prevotella bivia*, *Porphyromonas* spp., *Eubacterium* spp., *Sneathia* spp., *Leptotrichia* spp., *Fusobacterium* spp., *Megasphaera* spp., *Veillonella* spp., *Diliaster* spp., *Lachnobacterium* spp., *Clostridium* spp., *Mobiluncus* spp., *Corinebacterium* spp., *Peptostreptococcus* spp., *Atopobium vaginae*, *Bacteroides* spp., *Peptococcus* spp., *Mycoplasma* spp., BVAB-1,2,3, *Peptoniphilus* spp, *Eggerthella* spp., *Peptoniphilus lacrimalis*, *Arcanobacterium* spp., *Cryptobacterium* spp., *Tessaracoccus* spp., *Couchioplanes* spp., *Propioniferax* spp., *Hallella* spp., *Kaistella* spp., *Fluviivola* spp., *Crocinitomix* spp., *Flectobacillus* spp., *Persicivirga* spp., *Cloacibacterium*, *Papillibacter* spp., *Aerococcus* spp., *Pseudobutyribivibrio*, *Alloiococcus* spp., *Anaerococcus* spp., *Subdoligranulum* spp., *Fastidiosipila* spp., *Abitrophia* spp., *Pediococcus* spp., *Bulleidia* spp., *Butyrivibrio* spp., *Lactovum* spp., *Pelospora* spp., *Paucisalibacillus* spp., *Sporobacter* spp., *Acidaminococcus* spp., *Finegoldia* spp., *Caloranaerobacter* spp., *Desulfonispora* spp., *Isobaculum* spp., *Anaerobacter* spp., *Brevibacillus* spp., *Atopostipes* spp., *Ignavigranum* spp., *Staphylococcus* spp., *Ureibacillus* spp., *Cetobacterium* spp., *Acinetobacter* spp., *Caldilinea* , *Haemophilus* spp., *Sphingomonas* spp., *Olsenella* spp., *Slackia* spp., **etc**

ТЕСТЫ НА ОСНОВЕ ПЦР, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДНК

- * *C.trachomatis*
- * *M.hominis*
- * *M.genitalium*
- * *Ureaplasma parvum/urealyticum*
- * *G.vaginalis*
- * *C.albicans*
- * HSV, CMV, EBV
- * HPV
- * *N.gonorrhoeae*
- * *T.vaginalis*

Диагноз????

В РОССИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 69 ТОРГОВЫХ НАИМЕНОВАНИЙ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВАГИНИТОВ.

ПРИЧИНЫ РЕЦИДИВОВ ВАГИНИТА ОБЗОР 2015 ГОДА ПРОФ. ГИЛБЕРТ ДОНДЕРС (GILBERT G.G. DONDERS)

- Изолированный БВ «диагностируют» чаще, чем он на самом деле присутствует.
- Большинство рецидивирующих нарушений биоценоза влагалища связано с гипердиагностикой бак. вагиноза и применением препаратов метронидазола, которые не действуют на аэробные микроорганизмы.
- В этом случае при положительных критериях Амсея в вагинальных выделениях определяют лейкоцитоз, эпителиоциты в больших количествах (вплоть до парабазальных) и увеличение концентрации провоспалительных цитокинов (ИЛ-1 β , ИЛ-6, ИЛ-8).

Таблица. Сравнительная характеристика бактериального вагиноза и аэробного вагинита

Признак	Бактериальный вагиноз	Аэробный вагинит
<i>Lactobacillus spp.</i>	Отсутствуют или их количество снижено	Отсутствуют или их количество снижено
Основные возбудители	<i>Gardnerella vaginalis</i> , <i>Atopobium vaginae</i> , <i>Megasphaera spp.</i> , другие облигатные анаэробы	<i>St. aureus</i> , <i>Enterococcus faecalis</i> , <i>E. coli</i> , стрептококки группы В
Гиперемия слизистой оболочки влагалища	Отсутствует	Присутствует
Провоспалительные цитокины (ИЛ-1 β , ИЛ-6, ИЛ-8)	Умеренное количество	Высокое количество
Количество лейкоцитов в мазке	До 10–15 в поле зрения	Более 15–20 в поле зрения
рН	Более 4,5	Более 4,5
Эпителиоциты	Ключевые клетки	Парабазальные клетки
Аминный тест	Положительный	Отрицательный
Эпителий влагалища	10–12 слоёв	Массивное слущивание — десквамозный вагинит
Микроскопия мазка	Только поверхностные клетки в небольшом количестве	Много промежуточных и парабазальных клеток

Изменение подходов к лечению неспецифических вульвовагинитов

Неоправданно широко применяются антибактериальные препараты для местного применения, содержащие метронидазол и клиндамицин¹:

- ⑩ подавляют анаэробные возбудители
- ⑩ ↑ колонизация аэробными условно-патогенными микроорганизмами
- ⑩ ↑ количество рецидивов
- ⑩ ↓ лакто- и бифидофлоры влагалища

Loren Fishman

ПЛАЦЕБО

БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ,
СВЕРХСИЛЬНЫЕ ПЛАЦЕБО

"ХМ, ВОЗЬМУ ЛУЧШЕ ЭТИ."

Обзор международных и российских научных данных об использовании Полижинакса для лечения и профилактики неспецифического (аэробного), кандидозного и смешанного вагинитов

Общее количество публикаций по препарату Полижинакс

Распределение публикаций

КОНТИНГЕНТ ПАЦИЕНТОК, КОТОРЫМ НАЗНАЧАЛСЯ ПОЛИЖИНАКС

6 публикаций

IN -
VITRO

86 публикаций

применение Полижинакса при
лечении различных инфекций
влагалища в акушерско-
гинекологической практике

Репродуктивный возраст 4317

Беременные 524

Детский возраст 457

Менопаузальный возраст 118

В комплексном лечении 194

ВСЕГО: 5610

ЛЕЧЕНИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ, АЭРОБНЫХ И СМЕШАННЫХ ИНФЕКЦИЙ ПОЧЕМУ ПОЛИЖИНАКС ?

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА

Антибиотик комбинированный:
*аминогликозид+полиен+циклический
полипептид*

Код АТХ: G01AX

Действующие вещества

- Неомицина сульфат 35 000 МЕ
- Полимиксина В сульфат . . . 35 000 МЕ
- Нистатин 100 000 МЕ

Вспомогательные вещества

соевое масло гидрогенизированное, тефоз 63,
диметикон 1000

Состав оболочки капсулы

Желатин, глицерол, диметикон 1000

Широкий спектр :Полижинакс продемонстрировал эффективность на более чем 160 штаммах микроорганизмов, выделенных из урогенитального тракта женщин репродуктивного возраста (исследование *in vitro*)

ИССЛЕДОВАНО 163 ШТАММА МИКРООРГАНИЗМОВ:

- *Candida albicans*
- *Escherichia coli*
- *Citrobacter spp.*
- *Klebsiella spp.*
- *Proteus spp.*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Haemophilus spp.*
- *Streptococcus agalactiae*
- *Streptococcus spp.*
- *Enterococcus spp.*
- *Staphylococcus aureus*
- *Staphylococcus saprophyticus*
- *Lactobacillus spp.* и др.

Можно назначать в качестве эмпирической терапии до получения данных лабораторных исследований

Роль нистатина в лечении вульвовагинального кандидоза (ВВК):

Частота распространения грибковых вагинитов в составе смешанных инфекций, обусловленных *Candida non-albicans*, в разных странах составляет 10-80%² и имеет тенденцию к дальнейшему росту

ЕВРОПЕЙСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИЗНАЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИСТАТИНА В КАЧЕСТВЕ 1 ЛИНИИ МЕСТНОЙ ТЕРАПИИ ВВК, В Т. Ч. ПРИ ПРЕОБЛАДАНИИ ВИДОВ **CANDIDA NON-ALBICANS**, ОБЛАДАЮЩИХ ВЫСОКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ К АЗОЛАМ¹

(1) Choukri F. *et al.* (2014) *In vitro* susceptibility profile of 200 recent clinical isolates of *Candida* spp. to topical antifungal treatments of vulvovaginal candidiasis, the imidazoles and nystatin agents. *Journal of Medical Mycology* 24, 303-307.

(2) Achkar J.M. *et al.* (2010) *Candida* infections of the genitourinary tract. *Clinical Microbiology Reviews*, 23; 253-273.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР, ВЫВОДЫ: ЭФФЕКТЫ ПРЕПАРАТА ПОЛИЖИНАКС

- 1. Микробиологический эффект:** Полижинакс способствует быстрой эрадикации большинства Г-, Г+ микроорганизмов и грибов – возбудителей аэробного и смешанного вагинитов и ВВК. Микробиологическая эффективность в зависимости от этиологической формы заболевания отмечена от 73,6 до 92% больных (в среднем составила 87,1%).
- 2. Клинический эффект:** Полижинакс уменьшает симптомы инфекций влагалища (зуд, жжение, гиперемия, боли, патологические бели, раздражение, диспареунию) в течение первых суток от начала лечения. Установлена высокая клиническая эффективность при лечении аэробного (неспецифического) вагинита (95 – 100%); ВВК (74,5 – 87,6%), смешанного вагинита (88 – 92,3%). Общая средняя эффективность среди всех обследованных групп – 89,5%.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР, ВЫВОДЫ: ЭФФЕКТЫ ПРЕПАРАТА ПОЛИЖИНАКС

- 3. Противовоспалительный эффект:** Полижинакс обеспечивает выраженное снижение провоспалительных цитокинов IL8, TNF α .
- 4. Иммунокорригирующий эффект:** Полижинакс не оказывает иммуносупрессивного действия в отличие от кортикостероидов на эпителий влагалища, благодаря чему происходит быстрое восстановление функциональной активности эпителиоцитов в отличие от препаратов, содержащих кортикостероиды.

УРОВНИ МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛИЖИНАКСА И ТЕРЖИНАНА

- Полижинакс снижает уровень маркеров воспаления (IL8 и TNFα) сопоставимо с препаратом Тержинан, в состав которого входят глюкокортикоид
- Наличие глюкокортикоида в вагинальном лекарственном средстве не увеличивает противовоспалительный эффект

S. BOISNIC, M.C BRANCHET (GREDECO1), I. BERTAINA, F. VERRIERE
Медицинские аспекты здоровья женщины No 4(56)' 2012

МНОГОЦЕНТРОВОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕПАРАТОВ ПОЛИЖИНАКС И ТЕРЖИНАН В ТЕРАПИИ АЭРОБНОГО ВАГИНИТА

КИРА Е.Ф., 2010

Группа “Полижинакс”

100 % пациенток - нормализация количества лейкоцитов: 1-10 лейкоцитов в поле зрения

Группа “Тержинан”

7% пациенток - картина выраженного воспаления: лейкоциты покрывают все поле зрения

Полижинакс оказывает выраженное противовоспалительное действие без кортикостероида, **нормализуя количество лейкоцитов**

БОЛЕЕ БЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛАКТОФЛОРЫ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ ПОЛИЖИНАКС ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕПАРАТОМ ТЕРЖИНАН

Е.Ф. КИРА, 2010

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР, ВЫВОДЫ: ЭФФЕКТЫ ПРЕПАРАТА ПОЛИЖИНАКС

5. Противорецидивный эффект: 12-дневный курс Полижинакс снижает количество рецидивов неспецифического (аэробного), кандидозного и смешанного вагинитов за счёт нормализации микробиоты влагалища, улучшения биохимического состава влагалищной жидкости и сохранения функциональной активности эпителия влагалища.

6. Профилактический эффект: Полижинакс предупреждает развитие инфекционно-воспалительных заболеваний и осложнений после гинекологических операций, а также – у беременных женщин.

ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ АЭРОБНЫХ И СМЕШАННЫХ ВАГИНИТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛИЖИНАКС

- **Полижинакс** включен в Клинические рекомендации 2017 г. (по гинекологии и дерматовенерологии)
- Полижинакс : благодаря оптимальному составу обладает широким спектром противомикробного действия, оказывает выраженное противовоспалительное действие и способствует уменьшению симптомов заболевания с первых дней лечения
- В отличие от лекарственных средств, содержащих глюкокортикостероиды, Полижинакс не оказывает иммуносупрессивного действия на местный иммунитет и способствует быстрому восстановлению функциональной активности вагинального эпителия и числа лактобацилл.

Полижинакс включен в Федеральные клинические рекомендации РОАГ 2013 г. «Диагностика и лечение заболеваний, сопровождающихся патологическими выделениями из половых путей»
Рекомендован для лечения женщин со смешанными ВИ

1. Клинические рекомендации по аэробному вагиниту и урогенитальному кандидозу под редакцией д.м.н. проф. Рахматулиной М Р (2017)
2. Федеральные клинические рекомендации РОАГ 2013 г «Диагностика и лечение заболеваний , сопровождающихся патологическими выделениями из половых путей»

Спасибо за внимание!